




අ.පො.ස (උ.පෙළ) විභාගය - 2016

අැගයිමි වාර්තාව

02 - රසායන විද්‍යාව



පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව,
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව,
ජාතික අැගයිමි හා පරීක්ෂණ සේවාව.

2.1.3 I ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර
01.	4	26.	2
02.	1	27.	1
03.	5	28.	4
04.	4	29.	2
05.	3	30.	3
06.	3	31.	2
07.	4	32.	4
08.	5	33.	1 සහ 5
09.	5	34.	5
10.	1	35.	3
11.	2	36.	1
12.	4	37.	5
13.	2	38.	4
14.	5	39.	1
15.	2	40.	1
16.	සියල්ල	41.	2
17.	3	42.	4
18.	2	43.	5
19.	1	44.	3
20.	3	45.	1, 2 සහ 4
21.	3	46.	5
22.	3	47.	4
23.	1	48.	4
24.	5	49.	5
25.	5	50.	2 සහ 4

නිවැරදි එක් පිළිතුරකට ලකුණු 02 බැගින් ලකුණු 100කි.

2.2.3. II ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය සහ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා

★ II පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ප්‍රස්තාර 2, 3, 4.1, 4.2. හා 4.3 ඇසුරෙන් සකස් කර ඇත.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රශ්න හතරට ම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 10 කි.)

1 ප්‍රශ්නය

1. (a) ඔබට ආවර්තිතා වගුවේ p-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක් අඩංගු ලැයිස්තුවක් පහත සපයා ඇත.

B	C	N	O	F	Ne
Al	Si	P	S	Cl	Ar

එම ලැයිස්තුවෙන්,


- (i) ඉහළ දැඩි බවකින් යුතු සමපරමාණුක සහසංයුජ දැලිසක් සාදන අලෝහමය මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. C
.....
- (ii) වඩාත් ම පුළුල් ඔක්සිකරණ අවස්ථා පරාසයක් පෙන්නුම් කරන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. N/S/P/Cl/C
(මින් ඔත්තීම එකකට)
- (iii) වැඩි ම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. Ne
.....
- (iv) උභයගුණී ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. Al
.....
- (v) වායුමය බහුරූපී ආකාර දෙකක් ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. O
.....
- (vi) ප්‍රභල ම ඔක්සිකාරකය ලෙස සැලකෙන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. F
.....

(04 × 6 = ලකුණු 24)


සැ.යු. : යම් කොටසකට පිළිතුරු එකකට වඩා වැඩි ගණනක් ලියා ඇත්නම් ලකුණු නැත.

1(a) : ලකුණු 24

(b) පහත දී ඇති (i) සිට (v) කොටස් CN₄ අණුව මත පදනම් වේ. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.




(i) N—N බන්ධන දිග ආසන්න වශයෙන් සමාන බව උපකල්පනය කරමින්, මෙම අණුව සඳහා **වඩාත් ම** පිළිගත හැකි ලුවීස් ව්‍යුහය අඳින්න.



(ලකුණු 10)

(ii) මෙම අණුව සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ **තුනක්** අඳින්න (ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ව්‍යුහය හැර).




සැ.යු. : පළමු ප්‍රතිචාර තුන සලකන්න.

(05 × 3 = ලකුණු 15)

- (iii) ඉහත (i) හි අදින ලද ලුවීස් ව්‍යුහය පදනම් කර ගෙන, පහත වගුවේ දක්වා ඇති C සහ N පරමාණුවල,
 I. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල් II. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
 III. හැඩය IV. මුහුම්කරණය
 සඳහන් කරන්න.

CN₄ හි නයිට්‍රජන් පරමාණු පහත දක්වා ඇති ලෙස අංකනය කර ඇත:



		C	N ²	N ³
I.	VSEPR යුගල්	2	3	2
II.	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය	රේඛීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	රේඛීය
III.	හැඩය	රේඛීය	කෝණික/V	රේඛීය
IV.	මුහුම්කරණය	sp	sp ²	sp

(01 × 12 = ලකුණු 12)

- (iv) ඉහත (i) කොටසෙහි අදින ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි වැඩි විද්‍යුත් ඍණතාවයක් ඇත්තේ N² හෝ N³ ට දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබේ තේරුම ගැනීමට හේතු දක්වන්න. [පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.]

N³ > N² හෝ N² > වඩා N³ වල විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩිය. (05)

N³ - sp සහ ධන ආරෝපනයක්/ඔක්සිකරණ අවස්ථාව +1 වේ. (01 + 01)

N² - sp² සහ ආරෝපනය ශුන්‍ය වේ./ ඔක්සිකරණ අවස්ථාව -1 වේ. (01 + 01)

ධන ආරෝපනය වැඩිවන විට/විද්‍යුත්ඍණතාව වැඩිවන විට/ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථාව වැඩිවන විට (01)

මුහුම්කාක්ෂික s- ලක්ෂණ වැඩිවන විට විද්‍යුත්ඍණතාව වැඩිවේ. (01)

- (v) ඉහත (i) කොටසෙහි අදින ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/ මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. [පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.]

I. N ¹ -C	N ¹ sp හෝ 2p.....,	C..... sp.....
II. C-N ²	C..... sp.....,	N ² sp ²
III. N ² -N ³	N ² sp ²,	N ³ sp.....
IV. N ³ -N ⁴	N ³ sp.....,	N ⁴ sp ² හෝ 2p.....

(01 × 8 = ලකුණු 08)

සැ.යු. : (b)(i)හි ලුවීස් ව්‍යුහය වැරදි වුවත් මධ්‍ය පරමාණුවේ/පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් සැකැස්ම නිවැරදි නම් (b)(iii) හා (b)(v) සඳහා ද ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

1(b) : ලකුණු 56

- (c) පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සත්‍ය ද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන බව සඳහන් කරන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)

(i) SF₆ සහ OF₆ යන දෙක ම ස්ථායී අණු වේ. අසත්‍ය

(ii) SiCl₄, NCl₃ සහ SCl₂ හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය වතුස්තලීය වුවද ඒවායේ බන්ධන කෝණ වෙනස් ය. සත්‍ය

(iii) Kr හි තාපාංකය Xe හි තාපාංකයට වඩා වැඩි ය. අසත්‍ය

(iv) II වන කාණ්ඩයේ සල්ෆේටවල ද්‍රාව්‍යතාව කාණ්ඩයේ පහළට යන විට අඩු වන්නේ මූලික වශයෙන් කැටායනවල ජලීකරණ එන්තැල්පිය අඩුවන නිසා ය. සත්‍ය

(05 × 4 = ලකුණු 20)


1(c) : ලකුණු 20

1 සඳහා මුළු ලකුණු 100

2 ප්‍රශ්නය

2. (a) X සහ Y යනු ආවර්තිතා වගුවේ s-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය වේ. ඒවා ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සාදයි. Y හි හයිඩ්‍රොක්සයිඩයට වඩා X හි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය භාෂ්මික වේ. X හි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය ළදරුවන්ගේ සබන් නිෂ්පාදනයේ දී භාවිත කරයි. Y හි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය ගෝලීය උණුසුම්කරණය සඳහා ප්‍රධාන ලෙස භේතුවන වායුවලින් එකක් වන Z වායුව හඳුනාගැනීමට සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරයි.

(i) X සහ Y හඳුනාගන්න.



(03 + 03)

(ii) X සහ Y හි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියන්න.

X = $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Y = $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

(03 + 03)

(iii) පහත්සිළු පරීක්ෂාවේ දී X සහ Y හි ලවණ පෙන්වුම් කරන දැල්ලේ වර්ණ ලියන්න.

X : ලයිලැක්/දම්/රතටහුරු දම්

Y : ගඩොල් රතු/කහ රතු/තැඹිලි රතු

සැ.යු. : තැඹිලි පැහැයට වුවද ලකුණු ලබා දෙන්න.

(03 + 03)

(iv) X සහ Y හි පහත දෑ සඳහා සාපේක්ෂ විශාලත්වයන් දක්වන්න.

I. පරමාණුවේ විශාලත්වය $X > Y$

II. ඝනත්වය $Y > X$

III. ද්‍රව්‍යාංකය $Y > X$

IV. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය $Y > X$

(03 × 4)

සැ.යු. : a(i)හි එක පිළිතුරක් වැරදි වුවත් a(ii) හා a(iii) වල අදාළ නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු දෙන්න. X සහ Y දෙකම නිවැරදිව හඳුනා ගත්තේ නම් පමණක් a(iv) සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න. X = KOH හා Y = Ca(OH)₂ ලෙස පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් a(i) හා a(iv) සඳහා ලකුණු ලබා නොදෙන්න. නමුත් a(ii) හා a(iii) සඳහා නිවැරදි පිළිතුරු ඇත්නම් ලකුණු ලබාදිය හැක.



(v) Z හඳුනාගන්න.



(03)

(vi) Z හඳුනාගැනීම සඳහා Y හි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය භාවිත කළ හැක්කේ කෙසේ දැයි තුලිත රසායනික සමීකරණ පමණක් භාවිතයෙන් දක්වන්න.

සැ.යු. : අවක්ෂේප ඇතොත් “↓” ලෙස සහ හඳුනාගැනීමේ දී උපයෝගී වන අවක්ෂේපවල / ද්‍රාවණවල වර්ණ දක්වන්න.




සැ.යු. : Y නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇතිනම් පමණක් Ca වෙනුවට Y භාවිත කළ හැක.

(vii) කාබනේටයක් වශයෙන් පවතින Y හි ස්වභාවික ප්‍රභවයක්, විෂබීජ නාශකයක් නිෂ්පාදනයේ දී අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිත කෙරේ.

I. ස්වභාවික ප්‍රභවය නම් කරන්න. හුණු ගල්/කිරි ගරුඩ(මාබල්)/බෙලි කටු (03)

II. විෂබීජ නාශකය හඳුනාගන්න. Ca(OCl)₂.Ca(OH)₂.CaCl₂.2H₂O(s)/Ca(OCl)₂/විරංජන කුඩු (03)

III. විෂබීජ නාශකය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ පියවර තුළින් රසායනික සමීකරණ පමණක් භාවිතයෙන් ලියන්න.




සැ.යු. : භෞතික තත්ත්ව අවශ්‍ය නැත.







2(a) : ලකුණු 50

(b) (i) දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු ද්‍රාවණය තෝරා ගෙන කොටුව තුළ ලිවීමෙන්, පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ කරන්න.

ද්‍රාවණ ලැයිස්තුව (පිළිවෙළින් නොවේ)



සැ.යු. : එක් ද්‍රාවණයක් එක් වරක් පමණක් භාවිත කළ යුතු ය.




(04 × 6 = ලකුණු 24)

(ii) A සිට F දක්වා ඇති අවක්ෂේපවල රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

A BaCO₃ B PbI₂
 C Ag₂S₂O₃ D BaSO₃
 E AgBr F BaSO₄

(03 × 6 = ලකුණු 18)

(iii) ඉහත (b) (i) හි දැක්වෙන A, D හා E අවක්ෂේප ද්‍රාවණය වීම සඳහා තුළින් රසායනික සමීකරණ ලියන්න.




සැ.යු. : b(iii) සඳහා ස්වයන්තව ලකුණු ලබා දෙන්න.

2(b) : ලකුණු 50


2 සඳහා මුළු ලකුණු 100

3 ප්‍රශ්නය

3. (a) 227 °C හි දී, A වායුවෙන් මවුල 0.010 ක් රේඛනා කරන ලද 1.0 dm³ සංවෘත දෘඪ භාජනයක් තුළ ඝන උත්ප්‍රේරකයක් ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් හමුවේ තැබූ විට, එය පහත දැක්වෙන ආකාරයට වියෝජනය වේ.



A(g) හි සාන්ද්‍රණය කාලයත් සමග මනින ලදී. ප්‍රතිඵල පහත දැක්වෙන ප්‍රස්තාරයේ පෙන්වා ඇත.



(i) ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ සහ ශීඝ්‍රතා නියතය පිළිවෙළින් **a** සහ **k** ලෙස ගනිමින් ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ශීඝ්‍රතා ප්‍රකාශනය ලියන්න.

ශීඝ්‍රතාව = $k[A]^a$ හෝ (10)

$[-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]^a$ හෝ $-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^a$ සෘණ ලකුණ අඩංගුකර නැත්නම් ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න]

(ii) හේතු දක්වමින් **a** හි අගය නිර්ණය කරන්න.

ශීඝ්‍රතාව = $k[A]^0$ හෝ පෙළ = $a = 0$ (10)

ශීඝ්‍රතාව = නියතයක් වේ. (අනුක්‍රමනය නියතයක් වේ.) හෝ ශීඝ්‍රතාව සාන්ද්‍රණයෙන් ස්වායත්ත වේ. (05)

(iii) 227 °C හි දී ශීඝ්‍රතා නියතය, **k** ගණනය කරන්න.

ශීඝ්‍රතා නියතය, $k = |\text{ශීඝ්‍රතාවය}|$ (05)

$k = \left| \frac{(0.002 - 0.01) \text{ mol dm}^{-3}}{2000 \text{ s}} \right|$ හෝ වෙනත් ලක්ෂ්‍ය දෙකක් (04 + 01)

$k = 4.0 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$

(iv) ආරම්භයේ දී පැවති A(g) හි ප්‍රමාණයෙන් අඩක් වියෝජනය වී ඇති විට භාජනය තුළ පීඩනය ගණනය කරන්න. උත්ප්‍රේරකයෙහි පරිමාව නොසලකා හැරිය හැකි බව උපකල්පනය කරන්න.

බඳුනෙහි පරිමාව = 1.0 dm³



50% වියෝජනය වූ පසු

0.01(1-x) 0.01x 0.01x [සාන්ද්‍රණය mol dm⁻³ වලින්]

$t = 0$ දී වායු ප්‍රමාණය = 0.01 mol

50% වියෝජනය වූ පසු වායු ප්‍රමාණය = (0.005 + 0.005 + 0.005) mol

= 0.015 mol (05)

පරිපූර්ණ වායු හැසිරීම උපකල්පනය කරමින් $PV = nRT$

$$\begin{aligned} \text{පීඩනය} &= \frac{0.015 \text{ mol } 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} 500 \text{ K}}{10^{-3} \text{ m}^3} && \text{(08 + 02)} \\ &= 6.23 \times 10^4 \text{ Pa} && \text{(04 + 01)} \end{aligned}$$

3(a) : ලකුණු 60

(b) සන උත්ප්‍රේරකයක් හමුවේ **X** වායුව පහත දැක්වෙන රසායනික සමීකරණය අනුව වියෝජනය වේ.



රේඛනය කරන ලද භාජනයක් තුළට **X** වායුවෙන් මවුල 1.0 ක් ඇතුළත් කරන ලදී. වායුවේ ආරම්භක පරිමාව V_0 ලෙස මැන ඇත. උත්ප්‍රේරකයෙන් කුඩා ප්‍රමාණයක් (පරිමාව නොසලකා හැරිය හැක) ඇතුළත් කිරීමෙන් ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ කරන ලදී. උත්ප්‍රේරකය කරන ලද ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතා නියතය k_1 සහ **X** ට සාපේක්ෂව ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ **b** වේ. ප්‍රතික්‍රියාවේ ආරම්භක ශීඝ්‍රතාවය R_0 ලෙස මැන ඇත. භාජනය ප්‍රසාරණය වීමට ඉඩ හැරීමෙන් පද්ධතියේ පීඩනය නියත අගයක පවත්වා ගන්නා ලදී. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය ද නියත අගයක පවත්වා ගන්නා ලදී.

(i) **b**, k_1 සහ V_0 පද අනුසාරයෙන් R_0 සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

ආරම්භක ශීඝ්‍රතාව, $R_0 = k_1 [X]^b$

$$R_0 = k_1 \left(\frac{1.0 \text{ mol}}{V_0} \right)^b \quad \text{--- (1)} \quad \text{(10)}$$

(ඒකක අවශ්‍ය නොවේ.)

(ii) **X(g)** හි 50% ක ප්‍රමාණයක් වැය වූ විට ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වන භාජනයේ පරිමාව දෙගුණ වූ බව සහ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය $0.25R_0$ වූ බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ **b** ගණනය කරන්න.

50% වියෝජනය වූ පසු,

$$[X] = \frac{0.5 \text{ mol}}{2V_0} \quad \text{--- (05)}$$

මෙම අවස්ථාවේදී, ශීඝ්‍රතාවය $= 0.25R_0$

$$0.25R_0 = k_1 \left(\frac{0.5 \text{ mol}}{2V_0} \right)^b \quad \text{--- (2)} \quad \text{(10)}$$

(2)/(1) මගින්,

$$\frac{0.25 R_0}{R_0} = \frac{k_1 \left(\frac{0.5 \text{ mol}}{2V_0} \right)^b}{k_1 \left(\frac{1.0 \text{ mol}}{V_0} \right)^b} \quad \text{--- (10)}$$

$$0.25 = 0.25^b$$

$$b = 1 \quad \text{(05)}$$

(ඒකක අවශ්‍ය නොවේ.)

3(b) : ලකුණු 40

3 සඳහා මුළු ලකුණු 100

4 ප්‍රශ්නය

4. (a) (i) **A, B, C** සහ **D** යනු අණුක සූත්‍රය $C_4H_{10}O$ වූ ව්‍යුහ සමාවයවික වේ. සමාවයවික හතර ම ලෝහමය සෝඩියම් හා ප්‍රතික්‍රියා කර H_2 වායුව මුක්ත කරයි. සමාවයවික හතරින් **A** පමණක් ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව දක්වයි. **B, C** සහ **D**, $ZnCl_2$ අඩංගු සාන්ද්‍ර HCl වලට වෙන වෙන ම එකතු කළ විට, **B** අඩංගු මිශ්‍රණයෙහි ඉතා ඉක්මනින් ආවිලතාවයක් ඇති විය. **C** සහ **D** හි ආවිලතාව ඇති වීම ඉතා සෙමින් සිදු විය. **C** සහ **D** සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග රත් කළ විට **E** සහ **F** පිළිවෙළින් ලබා දුනි. **E** සහ **F** අණුක සූත්‍රය C_4H_8 වූ ව්‍යුහ සමාවයවික වේ. **E** සහ **F** සංයෝග දෙකෙන් එකක්වත් ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව නොපෙන්වයි. **E** සහ **F**, HBr සමග පිරිසම් කළ විට **G** සහ **H** පිළිවෙළින් ලබා දුනි. **G** පමණක් ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව පෙන්වයි. **A, B, C, D, E, F, G** සහ **H** හි ව්‍යුහ පහත දී ඇති කොටුවල අඳින්න. (ත්‍රිමාන සමාවයවික ආකාර ඇඳ දැක්වීම අවශ්‍ය නැත.)

$CH_3CH_2CH-CH_3$ $ $ OH	CH_3 $ $ CH_3-C-CH_3 $ $ OH	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$
A	B	C
CH_3 $ $ CH_3-C-CH_2OH $ $ H	$CH_3CH_2CH=CH_2$	$CH_3-C=CH_2$ $ $ CH_3
D	E	F
$CH_3CH_2CH-CH_3$ $ $ Br	CH_3 $ $ CH_3-C-CH_3 $ $ Br	සැ.යු. : A වැරදි නම් I සඳහා ලකුණු නැත. C වැරදි නම් J සඳහා ලකුණු නැත.
G	H	

(05 × 8 = ලකුණු 40)


(ii) **A** සහ **C**, PCC සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවූ විට **I** සහ **J** පිළිවෙළින් ලබා දුනි. **I** සහ **J** වල ව්‍යුහ පහත දී ඇති කොටුවල අඳින්න. ($PCC =$ පිරිසිදු ක්ලෝරෝක්‍රෝමිම්)










O $ $ $C_2H_5-C-CH_3$	O $ $ $CH_3CH_2CH_2-C-H$
I	J

(05 × 2 = ලකුණු 10)

4(a) : ලකුණු 50

(b) පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියාවල ප්‍රධාන කාබනික ඵල වන **K, L, M, N, O, P, Q, R, S** සහ **T** හි ව්‍යුහ 8 වන පිටුවෙහි දී ඇති අදාළ කොටුවල අඳින්න.








K

L




M



N

O


P



Q

R


S



T

සැ.යු. : Q : කැටයනය නොසලකා හරින්න.


R : මෙම ව්‍යුහවලට ලකුණු නොලැබේ.



(03 × 10 = ලකුණු 30)

4(b) : ලකුණු 30

(c) $C_2H_5CH=CHC_2H_5$ සහ $Br_2(CCl_4)$ අතර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා යන්ත්‍රණය ලියන්න.



සැ.යු. : වක්‍රය අතරමැදි ව්‍යුහය දක්වා නැතිනම් ලකුණු 06 නොලැබේ.

4(c) : ලකුණු 20

4 සඳහා මුළු ලකුණු 100

5 ප්‍රශ්නය

5. (a) 25 °C හි දී ඊතර් සහ ජලය අතර බියුටේන්ඩයිමයික් අම්ලයෙහි (BDA, HOOCCH₂CH₂COOH) විභාග සංගුණකය, K_D සෙවීම සඳහා පහත ක්‍රියාපිළිවෙළ අනුගමනය කරන ලදී.

පළමු ව ප්‍රතිකාරක බෝතලයක් තුළ සහ BDA වලින් 20 g ක්, ආසන්න වශයෙන් ඊතර් 100 cm³ ක් සහ ජලය 100 cm³ ක් අඩංගු මිශ්‍රණයක හොඳින් සොලවා ස්ථර වෙන්වීමට ඉඩ හරින ලදී. මෙම අවස්ථාවේ දිය නො වූ BDA යම් ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිකාරක බෝතලයේ පතුලේ දක්නට ලැබුණි. ඉන්පසු ඊතර් ස්ථරයෙන් 50.00 cm³ ක පරිමාවක් සහ ජල ස්තරයෙන් 25.00 cm³ ක පරිමාවක්, 0.05 mol dm⁻³ NaOH ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන ලදී. ඊතර් සහ ජල ස්තරවලින් ලබාගත් පරිමා සඳහා NaOH ද්‍රාවණයෙන් පිළිවෙළින් 4.80 cm³ සහ 16.00 cm³ අවශ්‍ය විය.

- (i) 25 °C හි දී ඊතර් සහ ජලය අතර බියුටේන්ඩයිමයික් අම්ලයෙහි ව්‍යාප්තිය සඳහා විභාග සංගුණකය, K_D ගණනය කරන්න.
- (ii) බියුටේන්ඩයිමයික් අම්ලයෙහි ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය 8.0 g dm⁻³ ලෙස දී ඇත්නම් ඊතර් තුළ මෙම අම්ලයේ ද්‍රාව්‍යතාව ගණනය කරන්න. (ලකුණු 4.0 යි)

(b) පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා සලකන්න. තාපගතික දත්ත සපයා ඇත්තේ සම්මත අවස්ථාව සඳහා නොවේ.

	$\Delta H/\text{kJ mol}^{-1}$	$\Delta S/\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$
$\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$	130	140
$\text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)}$	40	50

- (i) $2\text{CO(g)} \rightarrow \text{C(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔH සහ ΔS ගණනය කරන්න. ΔS හි ලකුණ, සිදු වන ප්‍රතික්‍රියාව හා එකඟ වේ දැයි හේතු සහිතව සඳහන් කරන්න.
- (ii) ඉහත (i) කොටසෙහි සඳහන් ප්‍රතික්‍රියාව 27 °C හි දී ස්වයංසිද්ධ වේ දැයි සුදුසු ගණනය කිරීමක් භාවිතයෙන් ප්‍රරෝකථනය කරන්න. (ලකුණු 4.0 යි)

(c) වැඩිපුර C(s) ප්‍රමාණයක් සහ CO₂(g) 0.15 mol ක් සංවෘත දෘඪ 2.0 dm³ භාජනයක තබා, උෂ්ණත්වය 689 °C හි දී පද්ධතිය සමතුලිතතාවට එළඹීමට ඉඩ හරින ලදී. සමතුලිතතාවට එළඹුණු විට භාජනය තුළ පීඩනය 8.0 × 10⁵ Pa බව සොයා ගන්නා ලදී. (689 °C හි දී RT = 8000 J mol⁻¹ ලෙස සලකන්න)

- (i) $\text{C(s)} + \text{CO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{CO(g)}$ ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතය, K_p සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
- (ii) 689 °C හි දී K_p හා K_c ගණනය කරන්න.
- (iii) වෙනත් පරීක්ෂණයක දී ඉහත විස්තර කළ භාජනය තුළ 689 °C හි දී වැඩිපුර C(s) සමග CO(g) සහ CO₂(g) අඩංගු වේ. එක් එක් වායුවෙහි ආරම්භක ආංශික පීඩනය 2.0 × 10⁵ Pa බැගින් වේ. පද්ධතිය සමතුලිතතාවට එළඹෙන විට CO₂(g) හි ආංශික පීඩනයේ වෙනස්වීම ගණනය කිරීමක් ආධාරයෙන් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 7.0 යි)

5. (a) (i) $\frac{n_{\text{butanedioic acid}}}{n_{\text{NaOH}}} = \frac{1}{2}$ හෝ ස්ටොයිකියෝමිතිය හඳුනා ගැනීම සඳහා (05)

බියුටේන්ඩයිමයික් අම්ලය = BDA

ඊතර් ස්ථරය

$$C_{\text{BDA}_{\text{ether}}} = \frac{1}{2} \times 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 4.8 \text{ cm}^3 / 50.00 \text{ cm}^3 \tag{03}$$

$$= 2.4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \tag{04 + 01}$$

ජලීය ස්ථරය

$$C_{\text{BDA}_{\text{aq}}} = \frac{1}{2} \times 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 16.0 \text{ cm}^3 / 25.00 \text{ cm}^3 \tag{02}$$

$$= 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \tag{04 + 01}$$

$$K_D = \frac{[\text{BDA}]_{\text{ether}}}{[\text{BDA}]_{\text{aqueous}}} \tag{05}$$

$$= \frac{2.4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}}{1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}} = 0.15 \text{ හෝ } 3/20 \tag{04 + 01}$$

$$\begin{aligned} \text{හෝ } K_D &= \frac{[BDA]_{\text{aqueous}}}{[BDA]_{\text{ether}}} \\ &= 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} / 2.4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} = 6.67 \text{ හෝ } 20/3 \end{aligned}$$

සැ.යු. : පියවර එකතු කළ හැක. ඒ අනුව ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

(ii) ද්‍රාව්‍යතාවය

$$[BDA]_{\text{ether}} = K_D [BDA]_{\text{Water}} \quad (03)$$

ඊතර් ස්ථරයෙන් 1.0 dm^3 හා ජලීය ස්ථරයෙන් 1.0 dm^3 ඇති මිශ්‍රණයක් සලකන්න.




$$\frac{x}{M_{\text{BDA}}} = \frac{0.15(8.0 \text{ g dm}^{-3})}{M_{\text{BDA}}} \quad (05)$$

$$x = 1.2 \text{ g dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$


(සැ.යු. : M_{BDA} නොමැතිව සමීකරණය පිළිගත හැක.)

5(a) : ලකුණු 40

(b) (i) ප්‍රතික්‍රියා දෙක පහත පරිදි ලියා එකතු කරන්න.



(ලකුණු ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතික්‍රියා එකතුකර මුලු ප්‍රතික්‍රියාව ලබාගත යුතුය.)
(භෞතික තත්ත්ව දැක්විය යුතුය.)



$$\Delta H = -130 \text{ kJ mol}^{-1} - 40 \text{ kJ mol}^{-1} = -170 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (04 + 01)$$

$$\Delta S = -140 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} - 50 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} = -190 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (04 + 01)$$

(සම්මත අවස්ථා ලියා ඇත්නම් ලකුණු නොලැබේ.)

ΔS හි ලකුණු සෘණ වේ. මෙය ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේ දී වායු මවුල ගණනෙහි අඩුවීම නිසා ඇතිවන එන්ට්‍රොපි අඩුවීම හා සැසඳේ. (05)

(ii) 27°C හි දී ΔG සොයන්න.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (02)$$

(සම්මත අවස්ථා ලියා ඇත්නම් ලකුණු නොලැබේ.)


$$\Delta G = -170 \text{ kJ mol}^{-1} - 300 \text{ K} \times (-190 \times 10^{-3} \text{ kJ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) \quad (04 + 01)$$

$$\Delta G = -113 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (04 + 01)$$


ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ වේ. (03)

(අවසාන ලකුණු 03 ලබාගැනීම සඳහා ගණනය අවශ්‍ය වේ.)

5(b) : ලකුණු 40



(i) $K_p = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}}$ (05)



මුළු වායු මවුල සංඛ්‍යාව = $0.15 - x$ (04 + 01)

පරිපූර්ණ වායු හැසිරීම උපකල්පනය කරමින් $PV = nRT$ යොදන්න.

$0.15 + x = \frac{8.0 \times 10^5 Pa \cdot 2.0 \times 10^{-3} m^3}{8.0 \times 10^5 J mol^{-2}}$ (04 + 01)

$x = 0.05 mol$ (04 + 01)

$n_{CO} = 0.1 mol$ $n_{CO_2} = (0.15 - 0.05) mol = 0.10 mol$

(03) (02)

එම නිසා

$P_{CO} = 2 \times 0.05 \times 8.0 \times 10^5 Pa / 0.2 = 4.0 \times 10^5 Pa$ (04 + 01)

$P_{CO_2} = 0.1 \times 8.0 \times 10^5 Pa / 0.2 = 4.0 \times 10^5 Pa$ (04 + 01)

$K_p = \frac{(4.0 \times 10^5 Pa)^2}{4.0 \times 10^5 Pa}$ (04 + 01)

$= 4.0 \times 10^5 Pa$ (04 + 01)

විකල්ප ගණනය කිරීම

$n_{total} = 0.20 mol, \therefore X_{CO} = X_{CO_2} = 1/2$ (05)

$P_{CO} = 8 \times 10^3 \times 1/2 = 4 \times 10^5 Pa$ (04 + 01)

$P_{CO_2} = 8 \times 10^3 \times 1/2 = 4 \times 10^5 Pa$ (04 + 01)

$K_p = (4 \times 10^5 Pa)^2 / 4 \times 10^5 Pa$ (04 + 01)

$K_p = 4 \times 10^5 Pa$ (04 + 01)

$K_c = K_p(RT)^{-\Delta n}$ හෝ $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (03)

$\Delta n = 1$ (02)

$K_c = 4.0 \times 10^5 Pa \times (8 \times 10^3 J mol^{-1})^{-1}$

$K_c = 50 mol m^{-3}$ හෝ $0.05 mol dm^{-3}$ (04 + 01)

විකල්ප ගණනය කිරීම

$K_c = [CO]^2 / [CO_2]$ (05)

$= [0.10 / (2 \times 10^{-3})]^2 / [0.10 / (2 \times 10^{-3})]$


$= 50 mol m^{-3} (0.05 mol dm^{-3})$ (04 + 01)

(iii) පීඩන භාවිතයෙන් Q ගණනය කරන්න.

$Q = \frac{(2.0 \times 10^5 Pa)^2}{2.0 \times 10^5 Pa} = 2.0 \times 10^5 Pa$ (05)

Q හි අගය K_p වඩා වැඩි වේ. එබැවින් $Q = K_p$ වන තුරු P_{CO_2} අඩුවන අතර P_{CO} වැඩිවේ. (05)

විකල්ප ගණනය කිරීම



$K_p = 4.0 \times 10^5 = \frac{(2 \times 10^5 + 2x)^2}{2.0 \times 10^5 - x}$ (05)

වර්ග සමීකරණය විසඳීම සහ P_{CO_2} අඩුවන බවත් P_{CO} වැඩිවන බවත් පුරෝකථනය කිරීම (05)

5(c) : ලකුණු 70

5 සඳහා මුළු ලකුණු 150

6 ප්‍රශ්නය

6. (a) 25 °C හි දී පරිමාමිතික ජලාස්කුවක් තුළ සංශුද්ධ දුබල අම්ලයකින් සුදුසු ප්‍රමාණයක් 25.00 cm³ දක්වා ආසුරන ජලයෙන් තනුක කිරීමෙන් HA දුබල අම්ලයෙහි 0.10 mol dm⁻³ ද්‍රාවණයක් සාදා ගන්නා ලදී. මෙම ද්‍රාවණයේ pH අගය 3.0 ක් විය.

- (i) HA(aq) + H₂O(l) ⇌ H₃O⁺(aq) + A⁻(aq) යන සමීකරණය සලකමින් දුබල අම්ලයේ විසඳන නියතය, K_a ගණනය කරන්න.
- (ii) මෙම HA දුබල අම්ලයෙහි තනුක ද්‍රාවණයක්, BOH ප්‍රභල භස්මයක් සමග අනුමාපනය කරන ලදී. සමකතා ලක්ෂ්‍යය ලඟා වූ පසු අනුමාපන මිශ්‍රණයේ pH අගය 9.0 බව සොයා ගන්නා ලදී. අනුමාපන මිශ්‍රණයේ ඇති AB ලවණයෙහි සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න. (25 °C දී K_w = 1.0 × 10⁻¹⁴ mol² dm⁻⁶)
- (iii) ඉහත අනුමාපන මිශ්‍රණය ආසුරන ජලය එක් කිරීමෙන් සියවරක් තනුක කරන ලදී. තනුක කරන ලද අනුමාපන මිශ්‍රණයෙහි pH අගය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 5.0 යි)

(b) AgBr(s) ජලයේ අල්ප වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය ලා කහ පැහැති ලවණයකි. 25 °C හි දී එහි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය, K_{sp} 5.0 × 10⁻¹³ mol² dm⁻⁶ වේ.

- (i) 25 °C හි දී සහ AgBr සමග සමතුලිතව පවතින සන්තෘප්ත AgBr ද්‍රාවණයක ඇති Ag⁺(aq) සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.
- (ii) ඉහත (i) කොටසෙහි විස්තර කර ඇති ද්‍රාවණයෙන් 100.0 cm³, සහ AgBr සමග බිකරයක අඩංගු වේ. මෙම බිකරයට ආසුරන ජලය 100.0 cm³ ක් එකතු කර සමතුලිතතාවට එළඹෙන තුරු මිශ්‍රණය හොඳින් කලතන ලදී. මෙම අවස්ථාවේ සහ AgBr යම් ප්‍රමාණයක් බිකරයේ පතුලේ තවදුරටත් ඉතිරි ව පැවතුණි. මෙම ද්‍රාවණයෙහි Ag⁺(aq) සාන්ද්‍රණය කුමක් විය හැකි ද? ඔබේ පිළිතුර පහදන්න.
- (iii) සුදුසු ගණනය කිරීමක් භාවිතයෙන් 25 °C හි දී 1.5 × 10⁻⁴ mol dm⁻³ AgNO₃ ද්‍රාවණයකින් 10.0 cm³ සහ 6.0 × 10⁻⁴ mol dm⁻³ NaBr ද්‍රාවණයකින් 5.0 cm³ මිශ්‍ර කළ විට බලාපොරොත්තු වන නිරීක්ෂණය පුරෝකථනය කරන්න. (ලකුණු 5.0 යි)

(c) (i) පරිපූර්ණ ද්‍රව්‍යාංශී ද්‍රාවණයක් සමග සමතුලිතව ඇති වාෂ්ප කලාපයෙහි පීඩනය P වේ. සංඝටක දෙකෙහි ද්‍රව කලාපයෙහි මවුල භාග X₁ හා X₂ වන අතර ඒවායේ සන්තෘප්ත වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් P₁⁰ සහ P₂⁰ වේ.

$$X_1 = \frac{P - P_2^0}{P_1^0 - P_2^0} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

- (ii) 50 °C හි දී මෙතනෝල් සහ එතනෝල් අඩංගු ද්‍රව්‍යාංශී ද්‍රාවණයක් සමග සමතුලිතව ඇති වාෂ්ප කලාපයෙහි පීඩනය 4.5 × 10⁴ Pa වේ. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී මෙතනෝල් සහ එතනෝල් හි සන්තෘප්ත වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් 5.5 × 10⁴ Pa සහ 3.0 × 10⁴ Pa වේ. ද්‍රාවණ පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙන බව සලකන්න.
 - I. ද්‍රව කලාපයෙහි මෙතනෝල් සහ එතනෝල් හි මවුල භාග ගණනය කරන්න.
 - II. වාෂ්ප කලාපයෙහි මෙතනෝල් සහ එතනෝල් හි මවුල භාග ගණනය කරන්න.
- (iii) ඉහත ගණනය කිරීම් සහ දී ඇති තොරතුරු පදනම් කර ගනිමින් 50 °C හි දී මෙතනෝල්-එතනෝල් මිශ්‍රණයෙහි වාෂ්ප පීඩන-සංයුති සටහන ඇඳ දක්වන්න. ද්‍රාවණ පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙන බව සලකන්න. (ලකුණු 5.0 යි)

6. (a) (i) pH = 3.0

$$[H^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

$$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)]} \quad (02)$$

(භෞතික අවස්ථා දැක්විය යුතුය.)

$$= \frac{(1.0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3})^2}{0.10 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (02 + 01)$$

$$= 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \quad (02 + 01)$$

(ii) සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී pH අගය ලවණයෙහි ජල විච්ඡේදන ප්‍රමාණය මගින් තීරණය වේ.



සලකන්න.

$$\frac{K_a}{K_w} = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)][OH^-(aq)]}$$

සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී $[HA(aq)] \approx [OH^-(aq)]$

$$\frac{K_a}{K_w} = \frac{[A^-(aq)]}{[OH^-(aq)]^2}$$

$$[OH^-(aq)] = \left[[A^-(aq)] \frac{K_w}{K_a} \right]^{1/2} \quad (1) \quad (05)$$

සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී $[A^-(aq)] = [salt]$

සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී pH = 9.0 වන බැවින් $[OH^-] = 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ (02)

$$[salt] = ([OH^-(aq)])^2 \frac{K_a}{K_w}$$

$$[salt] = (1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3})^2 \frac{1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}}{1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}} \quad (04 + 01)$$

$$= 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

(iii) සමකතා ලක්ෂ්‍යයේ දී අනුමාපන මිශ්‍රණය 100 වරක් තනුක කළ විට, (ලවන සාන්ද්‍රණය 100 ගුණයකින් අඩු වූ විට)

(1) වන සමීකරණය භාවිතයෙන්,

$$[OH^-(aq)]_{\text{new}} = \left[\frac{[A^-(aq)] K_w}{100 K_a} \right]^{1/2} \quad (05)$$

$$[OH^-(aq)]_{\text{new}} = \frac{1}{10} \left[\frac{[A^-(aq)] K_w}{1 K_a} \right]^{1/2}$$


$$[OH^-(aq)]_{\text{new}} = \frac{1}{10} \left[\frac{[0.1 \text{ mol dm}^{-3}]}{1} \frac{1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}}{1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}} \right]^{1/2} \quad (04 + 01)$$

$$[OH^-(aq)] = 1.0 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[H_3O^+(aq)] = 1.0 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

එම නිසා, pH = 8.0 (05)

විකල්ප ගණනය කිරීම



$$c(1-\alpha) \qquad \qquad \qquad c\alpha \qquad \qquad \qquad c\alpha$$

ඔස්ට්වල්ඩ් නියමයෙන්,

$$K_b = \alpha^2 c = \frac{\alpha^2 c^2}{c} = \frac{[OH^-]^2}{c}$$

$$[OH^-] = \sqrt{K_b c} = \sqrt{\frac{K_a}{K_w} c} \quad (05)$$


$$[salt] = [A^-] = c = 0.1 \text{ mol dm}^{-3} / 100$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}}{1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}} \times \frac{1 \times 10^{-1} \text{ mol dm}^{-3}}{100}} = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \quad (04 + 01)$$

$$pOH = 6.0$$

$$pH = 8.0 \quad (05)$$

6(a) : ලකුණු 50



(ii) ද්‍රාවණය AgBr හි සන්තෘප්ත ද්‍රාවණයක් වේ. (05)
 එම නිසා, $[\text{Ag}^+(\text{aq})]$ ඉහත පරිදීම වේ. $7.07 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$ (05)

(iii) Ag^+ හා Br^- සාන්ද්‍රණයන්හි ගුණිතය ගණනය කර සමග සංසන්දනය කළ යුතු වේ.
 $[\text{Ag}^+(\text{aq})] = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \times 10.00 \text{ cm}^3 / 15.00 \text{ cm}^3$
 $= 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ (04 + 01)
 $[\text{Br}^-(\text{aq})] = 6.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \times 5.00 \text{ cm}^3 / 15.00 \text{ cm}^3$
 $= 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ (04 + 01)
 $[\text{Ag}^+(\text{aq})] \times [\text{Br}^-(\text{aq})] = 2.0 \times 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} > K_{SP}$ (10)
 [හෝ වෙනත් නිවැරදි ක්‍රමයක්]
 එම නිසා, AgBr අවකේෂ වේ. (ලා කහ පැහැති අවකේෂයක් සෑදේ.) (05)


6(b) : ලකුණු 50

(c) (i) පරිපූර්ණ ද්‍රව්‍යයෙහි ද්‍රාවණයක් සඳහා රවුල් නියමය යෙදීමෙන්,
 $P_i = x_i P_i^0$ (05)
 $P = P_1 + P_2$ (05)
 $P = x_1 P_1^0 + x_2 P_2^0$ (05)
 $x_2 = 1 - x_1$
 $P = x_1 P_1^0 + (1 - x_1) P_2^0$
 $x_1 = \frac{(P_1 - P_2^0)}{(P_1^0 - P_2^0)}$ (05)

(ii) I ද්‍රව කලාපයෙහි මවුල භාග,
 $x_{\text{meOH}} = (4.5 - 3.0)10^4 \text{ Pa} / (5.5 - 3.0)10^4 \text{ Pa} = 0.6$ (04 + 01)
 $x_{\text{etOH}} = 1 - 0.6 = 0.4$ (04 + 01)

II ද්‍රව කලාපයෙහි මවුල භාග,
 $x_{\text{methanol_gas}} = 0.6 \times 5.5 \times 10^4 \text{ Pa} / 4.5 \times 10^4 \text{ Pa} = 0.73$ (04 + 01)
 $x_{\text{ethanol_gas}} = 1.0 - 0.73 = 0.27$ (04 + 01)
 (පිළිතුරු භාග ලෙස දැක්විය හැක.)

(iii) පීඩන සංයුති සටහන (පරිපූර්ණ මිශ්‍රණය)




සැ.යු. : එක් ඉරකට වඩා ඇඳ ඇත්නම් මුළු පීඩනය, P රේඛාව නම් කර තිබිය යුතු වේ.

6(c) : ලකුණු 50


6 සඳහා මුළු ලකුණු 150

7. (a)




සැ.යු. : NaBH₄ හි ප්‍රතික්‍රියා මාධ්‍ය නොසලකන්න.

විකල්ප පියවර :




or



7(a) : ලකුණු 60

- | | | | |
|-----|--|----------------------|------|
| (b) | R₁ KMnO ₄ / H ⁺ (06)
or K ₂ Cr ₂ O ₇ / H ⁺
or CrO ₃ | X₁ | (07) |
| | R₂ LiAlH ₄ (06) | X₂ | (07) |
| | R₃ H ⁺ or dil. HCl (05)
or dil. H ₂ SO ₄
or H ₂ O | X₃ | (07) |
| | R₄ PCl ₅ or PCl ₃ (06)
or SOCl ₂ | X₄ | (07) |
| | R₅ සාන්ද්‍ර H ₂ SO ₄ (06) | X₅ | (07) |







සැ.යු. : X₁ සිට X₄ සඳහා

 වෙනුවට  ඇඳ ඇත්නම් එක් වරක් පමණක් ලකුණු අඩු කරන්න.

X₅ සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය කිරීමට සියලුම ඇරෝමැටික වලයන් පෙන්විය යුතුය.

7(b) : ලකුණු 70



7(c) : ලකුණු 20

7 සඳහා මුළු ලකුණු 150

8 ප්‍රශ්නය

8. (a) **A** සංයෝගය ($A = MX_n$, $M = 3d$ ගොනුවට අයත් ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක්, $X =$ එකම වර්ගයකට අයත් ලිගන්) වැඩිපුර තනුක $NaOH$ සහ ඉන්පසු H_2O_2 සමග පිරියම් කළ විට **B** සංයෝගය ලබා දේ. **B** හි ජලීය ද්‍රාවණයක් තනුක H_2SO_4 මගින් ආම්ලිකාක කළ විට **C** සංයෝගය ලබා දේ. **C** සංයෝගය NH_4Cl සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට එක ඵලයක් ලෙස **D** සංයෝගය ලබා දේ. **D** සනය රත් කළ විට නිල්පැහැති **E** සංයෝගය, ජලවාෂ්ප සහ නිෂ්ක්‍රීය ද්විපරමාණුක **F** වායුව ලබා දේ. Ca ලෝහය **F** වායුවේ දහනය කළ විට සුදු **G** සනය ලබා දේ. ජලය සමග **G** හි ප්‍රතික්‍රියාවෙන් **H** වායුව නිදහස් කරයි. මෙම වායුව HCl වායුව සමග සුදු දුමාරයක් සාදයි. ද්‍රව **H** සමග Na ලෝහය ප්‍රතික්‍රියා කර එක් ඵලයක් ලෙස අවර්ණ ද්විපරමාණුක **I** වායුව ලබා දේ. **A** හි ජලීය ද්‍රාවණයක් වැඩිපුර Na_2CO_3 සමග පිරියම් කළ විට වර්ණවත් අවක්ෂේපයක් සෑදේ. මෙම අවක්ෂේපය පෙරා, පෙරනය තනුක HNO_3 වලින් ආම්ලිකාක කරනු ලැබේ. මෙම ද්‍රාවණයට $AgNO_3(aq)$ එකතු කළ විට තනුක NH_4OH වල ද්‍රාව්‍ය වන සුදු අවක්ෂේපයක් ලබා දේ.

- (i) **A, B, C, D, E, F, G, H** සහ **I** හඳුනාගන්න.
- (ii) **C** අඩංගු ද්‍රාවණයක් තනුක $NaOH$ වලින් පිරියම් කළ විට ඔබට කුමක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි වේ ද? මෙම නිරීක්ෂණයට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය දෙන්න. (ලකුණු 5.0 යි)

(b) **T** නම් ජලීය ද්‍රාවණයක ලෝහ අයන තුනක් අඩංගු වේ. මෙම ලෝහ අයන හඳුනාගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.


පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
1. තනුක HCl මගින් T ආම්ලිකාක කර, ලැබුණු පැහැදිලි ද්‍රාවණය තුළින් H_2S බුබුලනය කරන ලදී.	Q₁ කළ පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදුණි.
2. Q₁ පෙරා ඉවත් කරන ලදී. H_2S සියල්ල ම ඉවත් වන තුරු පෙරනය නවවන ලදී. ද්‍රාවණය සිසිල් කර, NH_4Cl හා NH_4OH එකතු කරන ලදී. ද්‍රාවණය තුළින් H_2S බුබුලනය කරන ලදී.	පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලැබුණි. Q₂ කළ පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදුණි.
3. Q₂ පෙරා ඉවත් කරන ලදී. H_2S සියල්ලම ඉවත් වන තුරු පෙරනය නවවා, $(NH_4)_2CO_3$ ද්‍රාවණයක් එකතු කරන ලදී.	Q₃ සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදුණි.

Q₁, Q₂ හා Q₃ අවක්ෂේප සඳහා පරීක්ෂණ :



පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
1. උණුසුම් තනුක HNO_3 හි Q₁ ද්‍රාවණය කරන ලදී. සිසිල් කිරීමෙන් පසු, ද්‍රාවණය උදාසීන කර KI එක් කරන ලදී.	අවක්ෂේපයක් හා දුඹුරු පැහැති ද්‍රාවණයක් සෑදුණි.
2. උණුසුම් තනුක HCl හි Q₂ ද්‍රාවණය කරන ලදී. ද්‍රාවණය සිසිල් කර, තනුක NH_4OH එක් කරන ලදී. මෙම මිශ්‍රණයට තවදුරටත් තනුක NH_4OH එක් කරන ලදී.	කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදුණි. කොළ පැහැති අවක්ෂේපය ද්‍රාවණය වී තද නිල් පැහැති ද්‍රාවණයක් ලැබුණි.
3. සාන්ද්‍ර HCl හි Q₃ ද්‍රාවණය කර ද්‍රාවණය පහත්සිළු පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී.	කොළ පැහැති දැල්ලක් ලැබුණි.

- (i) **T** ද්‍රාවණයේ ඇති ලෝහ අයන තුන හඳුනාගන්න. (හේතු අවශ්‍ය නැත)
- (ii) **Q₁, Q₂ හා Q₃** අවක්ෂේපවල රසායනික සූත්‍ර ලියන්න. (ලකුණු 5.0 යි)

(c) U ද්‍රාවණයේ අඩංගු Al^{3+} අයනවල සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන ක්‍රියාපිළිවෙළ යොදා ගන්නා ලදී. Al^{3+} අයන $pH = 5$ හි දී ඇලුමිනියම් ඔක්සිනේට්, $Al(C_9H_6ON)_3$ ලෙස අවක්ෂේප කිරීම සඳහා U ද්‍රාවණයෙන් 25.0 cm^3 කට වැඩිපුර 8-හයිඩ්‍රොක්සිකවින්තොලීන් (ඔක්සිජන් ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හැඳින්වේ. , C_9H_7ON) එකතු කරන ලදී. අවක්ෂේපය පෙරා, ආප්‍රැත ජලයෙන් සෝදා, වැඩිපුර KBr අඩංගු උණුසුම් තනුක HCl වල ද්‍රවණය කරන ලදී. ඉන්පසු, මෙම ද්‍රාවණයට 0.025 mol dm^{-3} $KBrO_3$ 25.0 cm^3 එකතු කරන ලදී. ඉහත දැක්වෙන ක්‍රියාපිළිවෙළ තුළ සිදු වන ප්‍රතික්‍රියා පහත දැක්වේ.



ආම්ලික මාධ්‍යයක දී Br_2 ජනනය කිරීම සඳහා $KBrO_3$ ප්‍රාථමික සම්මතයක් ලෙස යොදා ගනු ලැබේ.



වැඩිපුර Br_2 , KI සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් I_3^- ලබා දේ. ඉන්පසු I_3^- , 0.05 mol dm^{-3} $Na_2S_2O_3$ සමග පිෂ්ටය දර්ශකය වශයෙන් යොදා ගනිමින් අනුමාපනය කරන ලදී. අන්ත ලක්ෂ්‍යයට ළඟාවීමට අවශ්‍ය වූ $Na_2S_2O_3$ පරිමාව 15.00 cm^3 වේ. U ද්‍රාවණයේ ඇති Al^{3+} හි සාන්ද්‍රණය $mg\text{ dm}^{-3}$ වලින් ගණනය කරන්න. ($Al = 27$) (ලකුණු 5.0 යි)

8. (a) (i) A : $CrCl_3$ හෝ $CrCl_3 \cdot H_2O$ හෝ $[Cr(H_2O)_6]3Cl^-$
 B : Na_2CrO_4
 C : $Na_2Cr_2O_7$
 D : $(NH_4)_2Cr_2O_7$
 E : Cr_2O_3 (මිනෑම ක්‍රෝමියම් සංයෝගයක් සඳහා ලකුණු (05) ලබා දෙන්න.)
 F : N_2
 G : Ca_3N_2
 H : NH_3
 I : H_2

(05 × 9 = ලකුණු 45)

(ii) ද්‍රාවණය තැඹිලි සිට කහ පැහැයට හැරේ.

(01 + 01)



(03)

8(a) : ලකුණු 50

(b) (i) T හි අඩංගු කැටායන Cu^{2+} , Ni^{2+} , Ba^{2+}

(10 + 10 + 10)

(ii) $Q_1 : CuS$ $Q_2 : NiS$ $Q_3 : BaCO_3$

(07 + 07 + 06)

සැ.යු. : (i) ආරෝපණ අවශ්‍ය වේ. (ii) ස්වායත්තව ලකුණු දෙන්න.

8(b) : ලකුණු 50




$S_2O_3^{2-}$ හි මවුල ගණන $= \frac{0.05}{1000} \times 15.0$ (03)

එම නිසා, I_2 මවුල ගණන $= \frac{1}{2} \times \frac{0.05}{1000} \times 15.0$ (03)

එම නිසා අතිරික්ත Br_2 මවුල ගණන $= \frac{1}{2} \times \frac{0.05}{1000} \times 15.0$ (03)

$= 3.75 \times 10^{-4}$ (02)



BrO_3^- මවුල ගණන $= \frac{0.025}{1000} \times 25.0$ (03)

එම නිසා ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේදී සෑදුණ Br_2 මවුල ගණන

$= 3 \times \frac{0.025}{1000} \times 25.0$ (03)

$= 18.75 \times 10^{-4}$ (02)

මක්සිත් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ Br_2 මවුල ගණන $= (18.75 \times 10^{-4}) - (3.75 \times 10^{-4})$ (03)

$= 15 \times 10^{-4}$ (02)

එම නිසා, මක්සිත් මවුල ගණන $= \frac{1}{2} \times 15 \times 10^{-4}$ (03)

$= 7.5 \times 10^{-4}$ (02)

එම නිසා, Al^{3+} මවුල ගණන $= \frac{1}{3} \times 7.5 \times 10^{-4}$ (03)

$= 2.5 \times 10^{-4}$ (02)

$[Al^{3+}] = \frac{2.5 \times 10^{-4}}{25.0} \times 1000 \text{ mol dm}^{-3}$ (03)

$= \frac{2.5 \times 10^{-4}}{25.0} \times 1000 \times 27 \text{ g dm}^{-3}$ (03)

$= \frac{2.5 \times 10^{-4}}{25.0} \times 1000 \times 27 \times 1000 \text{ mg dm}^{-3}$ (03)

$= 270 \text{ mg dm}^{-3}$ (03)


8(c) : ලකුණු 50

8 සඳහා මුළු ලකුණු 150

9 ප්‍රශ්නය

9. (a) අනාගතයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික කර්මාන්තයක් ස්ථාපිත කිරීමට අවසන් වසරේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකු විසින් අදින ලද ගැලීම් සටහන පහත දැක්වේ.

ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍යයන්, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි සහ ඵල නිරූපණය කිරීමට පහත දැක්වෙන සංකේත භාවිත කෙරේ.



- (i) **R₁** සහ **R₂** ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍යයන් දෙක හඳුනාගන්න.
 - (ii) **M₁**, **M₂**, **M₃**, **M₄** නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි හතර හඳුනාගන්න. [උදා : ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය හෝ හේබර් ක්‍රමය]
 - (iii) **P₁** සිට **P₉** දක්වා ඵල හඳුනාගන්න.
 - (iv) **M₁** සහ **M₃** ක්‍රියාවලියන්හි පියවර කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (උපකරණවල රූපසටහන් අවශ්‍ය නොවේ)
 - (v) **M₂** ක්‍රියාවලියේ දී භාවිත කරන උපකරණය ඇඳ නම් කරන්න.
 - (vi) **M₃** ක්‍රියාවලියේ දී භාවිත වන ලවණය හඳුනාගන්න.
 - (vii) **P₅**, **P₆** සහ **P₉** හි එක් ප්‍රයෝජනයක් බැගින් දෙන්න. (ලකුණු 7.5යි)
- (b) පහත දී ඇති ලැයිස්තුව භාවිතයෙන් මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

CO₂, CH₄, වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන, NO, NO₂, N₂O, NO₃⁻, SO₂, H₂S, CFC, CaCO₃, ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් සහ ගල්ඇඟුරු

- (i) අම්ල වැසි ඇතිවීමට හේතුවන වායුමය විශේෂ දෙකක් හඳුනාගෙන මෙම විශේෂ මගින් අම්ල වැසි ඇතිවන ආකාරය තුලින් රසායනික සමීකරණ අනුසාරයෙන් කෙටියෙන් පහදා දෙන්න.
- (ii) අම්ල වැසි පරිසරය කෙරෙහි අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි. මෙම ප්‍රකාශය කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න.
- (iii) ෆොසිල ඉන්ධන දහනය හේතුවෙන් පරිසරයට එකතුවන විශේෂ තුනක්, ඒ එකිනෙකක් මගින් ඇති කරන එක් පාරිසරික ගැටලුවක් සමග හඳුනාගන්න.
- (iv) “කාර්මික සංශ්ලේෂිත ද්‍රව්‍ය ඉතා කුඩා ප්‍රමාණවලින් වායුගෝලයේ පැවතීම අහිතකර පාරිසරික ගැටලුවලට හේතු වේ.” උදාහරණයක් ලෙස CFC යොදා ගෙන මෙම ප්‍රකාශය පහදා දෙන්න.
- (v) හරිතාගාර වායු පහක් හඳුනාගෙන ඒ එක් එක් වායුව, වායුගෝලයට එක්වන මිනිස් ක්‍රියාකාරකමක් බැගින් සඳහන් කරන්න.
- (vi) ෆොසිල ඉන්ධන දහනයේ දී පිටවන ආම්ලික වායුන් ඉවත් කිරීමට ස්වාභාවික ද්‍රව්‍යයක් (ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගන්න) යොදා ගත හැකි ආකාරය තුලින් රසායනික සමීකරණ භාවිතයෙන් කෙටියෙන් පහදා දෙන්න. (ලකුණු 7.5යි)

9. (a) (i) R_1 : මුහුදු ජලය (03)
 R_2 : තෙල්/මේද/පොල්තෙල්/එළවළු තෙල් (03)
- (ii) M_1 : ලුණු නිෂ්පාදනය (03)
 M_2 : NaOH නිෂ්පාදනය (03)
 M_3 : Na නිෂ්පාදනය/නිස්සාරණය (ඩවුන්ස් කෝෂ ක්‍රමය) (03)
 M_4 : සබන් නිෂ්පාදනය (03)
- (iii) P_1 : NaCl (03)
 P_2 : බ්‍රෝමීන් ද්‍රාවණය/මවු ද්‍රාවණය/MgBr₂/කාරම් දිය (03)
 P_3 : NaOH (03)
 P_4 : Cl₂ (03)
 P_5 : H₂ (03)
 P_6 : Na (03)
 P_7 : NaOCl/මිලිටන් ද්‍රාවණය (03)
 P_8 : සබන් (03)
 P_9 : ග්ලිසරෝල්/ග්ලිසරීන් (03)


(iv) M_1 - ක්‍රියාවලිය

- මුහුදු ජලය තටාක තුනක් තුළදී වාෂ්ප වීමට ඉඩ හරි. (01)
 1 තටාකය : CaCO₃ අවක්ෂේප වේ. (01) උඩුගිය ද්‍රාවණය දෙවන ටැංකියට මාරු කෙරේ. (01)
 2 තටාකය : CaSO₄ අවක්ෂේප වේ. (01) උඩුගිය ද්‍රාවණය තුන්වන තටාකයට මාරු කෙරේ. (01)
 3 තටාකය : NaCl අවක්ෂේප වේ. (01) උඩුගිය ද්‍රාවණය (බ්‍රෝමීන්) ඉවත් කෙරේ. (01)
 සැ.යු. : ඉහත ක්‍රියාවලිය රූප සටහන් මගින් නිරූපණය කිරීම ද පිළිගත හැක.

M_3 - ක්‍රියාවලිය

- CaCl₂ එකතු කරන ලද විලින NaCl විද්‍යුත් විච්ඡේදනය (01)
 කැතෝඩයේ දී $Na^+(l) + e \longrightarrow Na(l)$ (02)
 ඇනෝඩයේ දී $2Cl^-(l) \longrightarrow Cl_2(g) + 2e$ (02)
 Na හා Cl₂ වායුව අතර ප්‍රතික්‍රියාව වැළැක්වීමට කැතෝඩ හා ඇනෝඩ කුටීර වානේ දැල් ප්‍රාචීරයකින් වෙන් කෙරේ. (02)
 සැ.යු. : සමීකරණ සඳහා භෞතික තත්ත්ව අවශ්‍ය වේ.


(v)



- සැ.යු. : ස්වායත්තව ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.
 (නම් කිරීමට ලකුණු 01 x 9 + නිවැරදි රූප සටහනට ලකුණු 01 = ලකුණු 10)

විකල්ප පිළිතුර :

ප්‍රාචීර කෝෂය



(නම් කිරීමට ලකුණු 01 x 9 + නිවැරදි රූප සටහනට ලකුණු 01 = ලකුණු 10)

(vi) CaCl_2 (03)

(vii) P₅ : ඉන්ධන/HCl නිපදවීම/මාගරින් නිපදවීම/කාලගුණ බැලුනවල භාවිතයට/
NH₃ නිෂ්පාදනයේ දී (01)

P₆ : සෝඩියම් වාෂ්ප ලාම්පු/NaNH₂ නිපදවීම/කාබනික ද්‍රාවක වියලා ගැනීමට/
නාෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල සිසිලන කාරකය (01)

P₉ : රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනවලට/TNG (ස්පෝර්ට්) නිපදවීමට (01)

9(a) : ලකුණු 75

(b) (i) NO₂, SO₂, NO (මිනැම දෙකක්) (02 + 02)

From NO :
2NO(g) + O₂(g) → 2NO₂(g) (02)

4NO₂(g) + O₂(g) + 2H₂O(l) → 4HNO₃(aq) (02)

HNO₃(aq) → H⁺(aq) + NO₃⁻(aq) (01)

From NO₂ :
4NO₂(g) + O₂(g) + 2H₂O(l) → 4HNO₃(aq) (03)

HNO₃(aq) → H⁺(aq) + NO₃⁻(aq) (02)

From SO₂ :
2SO₂(g) + O₂(g) → 2SO₃(g) (02)

SO₃(g) + 2H₂O(l) → H₂SO₄(aq) (02)

H₂SO₄(aq) → 2H⁺(aq) + SO₄²⁻(aq) (01)

හෝ

2SO₂(g) + O₂(g) + 2H₂O(l) → 2H₂SO₄(aq) (03)

H₂SO₄(aq) → 2H⁺(aq) + SO₄²⁻(aq) (02)

(ඉහත දී ඇති මිනැම ප්‍රතික්‍රියා කාණ්ඩ දෙකක් මගින් අම්ල වැසි ඇති වීම සඳහා ලකුණු 05 x 2 = 10)

සැ.යු. : භෞතික තත්ත්ව දැක්වීම අවශ්‍ය නොවේ.

(ii) අඩංගු විය යුතු කරුණු :

- ශාඛවලට සිදුවන හානි
- H_2SO_4 හා HNO_3 වැනි අම්ල මගින් පසෙහි ඇති ඇලුමිනෝ සිලිකේටය ද්‍රව්‍ය දියවීම හා Al^{3+} ජලයට මුදා හැරීම. එමගින් මත්ස්‍ය කරමල්වල ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා පැමිණීමෙන් මත්ස්‍යයින් මිය යාම.
- පසෙහි ඇති පෝෂක ද්‍රව්‍ය ඉවත්වීම.
- ලෝහමය ආකෘති (උදා: මෝටර් රථ, පාලම්, ගොඩනැගිලි, ප්‍රතිමා) දිරාපත් වීම.
- ජලයේ කඨිනත්වය වැඩිවීම.
- ජලයේ දිය වූ බැර ලෝහ සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම.
- පෘථිවි කබොලේ සංයුතිය වෙනස් වීම. (උදා : ඩොලමයිට්, හුණු ගල් හා කිරි ගරුඬ, වැලි පාෂාණ ආම්ලික ජලයේ දිය වීම/ සල්ෆයිඩ් ඛනිජ අම්ල මගින් ඔක්සිකරණය වීම.)

(මින් ඕනෑම කරුණු පහකට $02 \times 5 =$ ලකුණු 10)

(iii) SO_2, NO, NO_2, CO_2 , වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන (ඕනෑම තුනක්)	(02 + 02 + 02)
ගෝලීය උණුසුම - CO_2 , වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන	(02 + 01)
අම්ල වැසි - SO_2, NO	(02 + 01)
ප්‍රකාශ රසායන දූෂිතා - NO , හයිඩ්‍රොකාබන	(02 + 01)

- (iv)
- CFC යනු ශීතකරණ හා වායු සමන යන්ත්‍ර සඳහා ගන්නා කාර්මික සිසිලනකාරක වායුවකි.
 - එම උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීමේදී හා භාවිතයේ දී CFC සුළු වශයෙන් වාතයට එකතු වෙයි.
 - එම නිසා CFC යනු වායුගෝලයේ සුළු වශයෙන් පවත්නා නමුත් ස්ථායී වායුවකි.
 - එම නිසා CFC වායුගෝලයේ දිගු කාලයක් පවතී.

සහ

- CFC ඉහළ වායුගෝලයට ලගා වූ විට අධි ශක්තිය UV කිරණ හමුවේ වියෝජනය වී Cl^* මුක්ත කණ්ඩක හට ගනී.
- මෙම Cl^* මුක්ත කණ්ඩක, උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියාකර ඕසෝන් හායනය වේගවත් කරයි.
- මේ හේතුවෙන් අහිතකර (අධි ශක්ති) UV කිරණ, පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ඇතුල් වේ.
- මෙම අහිතකර UV කිරණවලට නිරාවරණය වීමෙන් සමේ පිළිකා, ජාන විකෘතිතා සහ ඇසේ සුද ඇති වේ.

හෝ

- CFC යනු ප්‍රබල හරිතාගාර වායුවකි.
- එය පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙන් නිකුත් කරන IR කිරණ උරා ගනියි.
- මේ නිසා CFC ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට දායක වේ.
- එය දේශගුණික විපර්යාසවලට දායක වේ.

(02 × 8 = ලකුණු 10)

- (v) CO₂ : (ෆොසිල) ඉන්ධන දහනය (01 + 01)
- CH₄ : තෙත් බිම් කෘෂිකර්මය/සත්ව ගොවිපොළවල්/කසළ නිසි ක්‍රමවේදයකට බැහැර නොකිරීම (01 + 01)
- NO₂ : ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී සිදුවන දහන ක්‍රියාවලි මගින් (01 + 01)
- CFCs : වායු සමන යන්ත්‍ර/ශිතකරණ/විසරණ ප්‍රවාහක (01 + 01)
- N₂O : කෘෂිකර්මය (නයිට්‍රජන් පොහොර භාවිතාව) (01 + 01)
- H₂S : පොල් ලෙලි වැනි සල්ෆර් අඩංගු ද්‍රව්‍ය නිර්වායු වියෝජනය වීමේ දී (පොල් ලෙලි පල් කිරීම) (01 + 01)
- SO₂ : ෆොසිල ඉන්ධන දහනය (01 + 01)
- වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන : ෆොසිල ඉන්ධන දහනය, ස්වභාවික වායු නිෂ්පාදනය, ප්‍රවාහන සහ කර්මාන්තවලදී (01 + 01)
- (ඕනෑම පහක් 02 × 5 = ලකුණු 10)

- (vi) හුණුගල් (CaCO₃) වියෝජනය වී CaO(lime) සහ CO₂ ලබාදේ. (02)
- $$\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2 \quad (03)$$
- ඉන්පසු CaO, SO₂ සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. (02)
- $$\text{CaO} + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{CaSO}_3 \quad (03)$$
- සැ.යු. : සමීකරණය පමණක් දී ඇත්නම් ලකුණු 05 හෝ
- SO₂ අවශෝෂණය කිරීම හෝ Scrub කිරීම සඳහා හුණුගල්වල උකු මිශ්‍රණයක් භාවිත වේ. (05)
- $$\text{CaCO}_3 + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{CaSO}_3 + \text{CO}_2 \quad (05)$$

9(b) : ලකුණු 75

9 සඳහා මුළු ලකුණු 150


10 ප්‍රශ්නය

10. (a) X, Y හා Z සංගත සංයෝග වේ. ඒවාට අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් ඇත. X, Y හා Z හි සංගත ගෝලයේ ඇති විශේෂයන්හි (එනම් ලෝහ අයනය සහ එයට සංගත වී ඇති ලිගන්) පරමාණුක සංයුතිය පිළිවෙළින්, $FeH_{10}CNO_5S$, $FeH_8C_2N_2O_4S_2$ හා $FeH_6C_3N_3O_3S_3$ වේ. සංයෝග තුනෙහිම ලෝහ අයනයේ ඔක්සිකරණ අවස්ථාව එකම වේ. එක් එක් සංයෝගයෙහි ලිගන් වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. මෙම සංයෝගවල සංගත නොවූ ඇතායන ඇත්නම් ඒවා එක ම වර්ගයේ වේ.

S ජලීය ද්‍රාවණයක මවුල අනුපාත 1 : 1 : 1 වන පරිදි X, Y හා Z අඩංගු වේ. S ද්‍රාවණයෙහි එක් එක් සංයෝගයේ සාන්ද්‍රණය 0.10 mol dm^{-3} වේ. S හි 100.0 cm^3 ට වැඩිපුර $AgNO_3$ ද්‍රාවණයක් එක් කළ විට කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදුණි. අවක්ෂේපය ජලයෙන් සෝදා, ස්කන්ධයේ වෙනසක් නොවන තුරු උදුනක වියළූ ලදී. අවක්ෂේපයේ ස්කන්ධය 7.05 g විය. මෙම අවක්ෂේපය සාන්ද්‍ර NH_4OH හි ද්‍රාවණය නො වේ.

(කහ පැහැති අවක්ෂේපයේ අඩංගු රසායනික සංයෝගයෙහි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය = 235)

- (i) X, Y හා Z හි ලෝහ අයනවලට සංගත වී ඇති ලිගන් හඳුනාගන්න.
- (ii) කහ පැහැති අවක්ෂේපයේ රසායනික සූත්‍රය ලියන්න.
- (iii) X, Y හා Z හි ව්‍යුහ, හේතු දක්වමින් නිර්ණය කරන්න.
- (iv) එතිලීන්ඩයිඇමීන් (en) හි ව්‍යුහය පහත දී ඇත.



එතිලීන්ඩයිඇමීන් එහි නයිට්‍රජන් පරමාණු දෙක මගින් M^{3+} ලෝහ අයනයට සංගත වී Q සංකීර්ණ අයනය (එනම් ලෝහ අයනය සහ එයට සංගත වී ඇති ලිගන්) සාදයි. Q ට අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් ඇත.

Q හි ව්‍යුහ සූත්‍රය ලියා එහි ව්‍යුහය අඳින්න.

ඔ.ශු. ලෝහ අයනයට එතිලීන්ඩයිඇමීන් පමණක් සංගත වී ඇතැයි සලකන්න. ඔබගේ ව්‍යුහ සූත්‍රයේ එතිලීන්ඩයිඇමීන් 'en' යන කෙටි හැඳින්වීමෙන් පෙන්නුම් කරන්න. (ලකුණු 7.5 යි)


(b) පහත දැක්වෙන දෑ මඬට සපයා ඇත.

- $Al(NO_3)_3$, $Cu(NO_3)_2$ සහ $Fe(NO_3)_2$ වල 1.0 mol dm^{-3} ජලීය ද්‍රාවණ
- Al, Cu සහ Fe ලෝහ කුරු
- ලවණ සේතුවල භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය
- සන්නායක රැහැන් (conducting wires) සහ බිකර

මීට අමතරව පහත දැක්වෙන දත්ත ද සපයා ඇත.

$$E_{Fe^{2+}/Fe}^{\circ} = -0.44 \text{ V}, \quad E_{Al^{3+}/Al}^{\circ} = -1.66 \text{ V}, \quad E_{Cu^{2+}/Cu}^{\circ} = +0.34 \text{ V}$$

- (i) ඉහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කර ගනිමින් ගොඩනැගිය හැකි විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ තුන රූපීයගත කරන්න. එක් එක් කෝෂයෙහි ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය ඒවායේ ලකුණු සමග දක්වන්න.
- (ii) ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද එක් එක් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ,
 - I. කෝෂ අංකනය දෙන්න.
 - II. E_{cell}° නිර්ණය කරන්න.
 - III. භෞතික තත්ත්ව දක්වමින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න.
- (iii) පහත දැක්වෙන කුමන සංයෝග(ය) ලවණ සේතුවල භාවිතයට සුදුසුදැයි හේතු දක්වමින් පහදා දෙන්න.



- (iv) ආරම්භයේ දී වැඩිම E_{cell}° පෙන්නුම් කරන විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය සලකන්න. මෙම විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය සකස් කර ඇත්තේ එහි එක් එක් කුටීරයට අදාළ ද්‍රාවණවල පරිමාවන් සමාන වන ලෙස බවත් ඒවායේ පරිමාවන් පරීක්ෂණය සිදු කරන කාලය තුළ දී නොවෙනස්වන බවත් උපකල්පනය කරන්න. මෙම කෝෂයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක සන්නායක රැහැනකින් සම්බන්ධ කර යම් කාලයකට පසු ඇනෝඩ කුටීරය තුළ ඇති ලෝහ අයන සාන්ද්‍රණය $C \text{ mol dm}^{-3}$ බව සොයා ගන්නා ලදී. කැතෝඩ කුටීරය තුළ ඇති ලෝහ අයන සාන්ද්‍රණය C ඇසුරින් ප්‍රකාශ කරන්න. (ලකුණු 7.5 යි)

10.(a) (i) $\text{SCN}^- / \text{NCS}^-$ සහ H_2O

(05 + 05)

(ii) AgI

(05)

(iii) පරමාණුක සංයුතිය පදනම් කර ගනිමින්,

X හි සංගත ගෝලය $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{SCN})]$ හෝ $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]$ (05)

Y හි සංගත ගෝලය $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{SCN})_2]$ හෝ $[\text{Fe}(\text{SCN})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ (05)

Z හි සංගත ගෝලය $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{SCN})_3]$ හෝ $[\text{Fe}(\text{SCN})_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ (05)

සැ.යු. : (SCN) වෙනුවට (NCS) යෙදිය හැකි, H_2O ලිගන්දය OH_2 ලෙස ද ලිවිය හැක.

$$\begin{aligned} \text{එක් එක් X, Y හා Z සංයෝගයේ මවුල සංඛ්‍යාව } 100 \text{ cm}^3 &= (0.1/1000) \times 100 \\ &= 0.01 \end{aligned} \quad (05)$$

$$\text{AgI හි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය} = 235$$

$$\text{එම නිසා අවකේෂ්පයේ ඇති AgI (or I}^-) \text{ මවුල ගණන} = 7.05/235 = 0.03 \quad (05)$$

Fe හි ඔක්සිකරණ අවස්ථාව +3 නම්;

X : සංකීර්ණයේ ආරෝපණ +2 වන විට I^- දෙකක් ඇත. (02)

Y : සංකීර්ණයේ ආරෝපණ +1 වන විට I^- එකක් ඇත. (02)

Z : සංකීර්ණයේ ආරෝපණයක් නොමැති විට I^- නැත. (02)

එම නිසා Fe ඔක්සිකරණ අවස්ථාව +3 වේ. (04)

හෝ

Fe හි ඔක්සිකරණ අවස්ථාව +2 නම්;

X : සංකීර්ණයේ ආරෝපණ +1 වන විට I^- එකක් ඇත. (02)

Y : සංකීර්ණයේ ආරෝපණ 0 වන විට I^- නැත. (02)

Z : සංකීර්ණයේ ආරෝපණය -1 වන විට I^- නැත. (02)

එම නිසා Fe ඔක්සිකරණ අවස්ථාව +2 විය නොහැකිය. එය +3 විය යුතුය. (04)

ව්‍යුහ සූත්‍රය :

X : $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{SCN})]\text{I}_2$ හෝ $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{I}_2$ (05)

Y : $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{SCN})_2]\text{I}$ හෝ $[\text{Fe}(\text{SCN})_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{I}$ (05)


Z : $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{SCN})_3]$ හෝ $[\text{Fe}(\text{SCN})_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ (05)

සැ.යු. : • (SCN) වෙනුවට (NCS) යෙදිය හැක. (CNS)/(CSN) ලෙස ලියා ඇත්නම් ලකුණු නොලැබේ. H_2O ලිගන්දය OH_2 ලෙස ද ලිවිය හැක.

• X, Y, Z හි සංගත ගෝල දක්වා නැති වුවත් X, Y, Z හි ව්‍යුහ සූත්‍ර ලියා ඇත්නම් නිවැරදි ව්‍යුහ සූත්‍රවලට ලකුණු (05 + 05 + 05) වලට අමතරව සංගත ගෝලයට අදාළ ලකුණු (05 + 05 + 05) ද ප්‍රදානය කරන්න.

(iv) $(M(en)_3)^{3+}$

(05)




(05)

සැ.යු. : ලකුණු ප්‍රදාන කිරීම සඳහා ආරෝපනය දැක්වීම අවශ්‍ය වේ.

10(a) : ලකුණු 75

(b) (i)



එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සඳහා,

- ලෝහ කුර ඇඳ තිබීම හා එය හඳුනා ගැනීම (01)
- ද්‍රාවනය හඳුනා ගැනීම (01)
- නිවැරදි ආරෝපණ දැක්වීම (01)
- ඇනෝඩය හෝ කැතෝඩය ලෙස නිවැරදිව අංකනය කිරීම (01)
- ලවන සේතුව ඇඳ තිබීම (01)

සැ.යු. : එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට වෙන් වෙන්ව ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න. වෝල්ට් මීටරයක් ඇඳ ඇත්නම් ලකුණු අඩු නොකරන්න. බැටරියක් හෝ බාහිර විභවයක් සම්බන්ධ කර ඇත්නම් ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න.

ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වයරයකින් සම්බන්ධ කර ඇත්නම් ලකුණු 02ක් අඩු කරන්න.

(කෝෂ තුන සඳහා ලකුණු 27)

- (ii) I. Cell A : $\text{Al(s)}|\text{Al}^{3+}(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})||\text{Fe}^{2+}(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})|\text{Fe(s)}$ (02)
 Cell B : $\text{Al(s)}|\text{Al}^{3+}(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})||\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})|\text{Cu(s)}$ (02)
 Cell C : $\text{Fe(s)}|\text{Fe}^{2+}(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})||\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})|\text{Cu(s)}$ (02)

II. $E^0_{\text{cell}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}$ හෝ $E^0_{\text{cell}} = E^0_{\text{RHS}} - E^0_{\text{LHS}}$ (03)

Cell A

$E^0_{\text{cell}} = -0.44 \text{ V} - (-1.66 \text{ V})$ (02)
 $= 1.22 \text{ V}$ (01 + 01)

Cell B

$E^0_{\text{cell}} = 0.34 \text{ V} - (-1.66 \text{ V})$ (02)
 $= 2.00 \text{ V}$ (01 + 01)

Cell C

$E^0_{\text{cell}} = 0.34 \text{ V} - (-0.44 \text{ V})$ (02)
 $= 0.78 \text{ V}$ (01 + 01)

- III. Cell A : $\text{Al(s)} \rightleftharpoons \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}$ (01)
 $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Fe(s)}$ (01)

- Cell B : $\text{Al(s)} \rightleftharpoons \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}$ (01)
 $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Cu(s)}$ (01)

- Cell C : $\text{Fe(s)} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}$ (01)
 $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{Cu(s)}$ (01)

සැ.යු. : \rightleftharpoons වෙනුවට \longrightarrow ඇඳ ඇත්නම් ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න.
 භෞතික තත්ව දැක්විය යුතුය.

- (iii) NaOH - සුදුසු නැත, ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සෑදිය හැක. (02)
 NaNO₃ - සුදුසු වේ. හොඳ අයනික සන්නායකතාවක් ඇත. හෝ (සුදුසු නොවේ Na⁺ හා NO₃⁻ හි අයනික සන්නායකතා අසමාන වේ.) (02)
 ඇසිටික් අම්ලය - සුදුසු නැත. දුර්වල වශයෙන් අයනීකරණය වේ, අඩු සන්නායකතාවයක් ඇත. (02)

(iii) සඳහා විකල්ප පිළිතුර - 1


- දී ඇති කිසිම සංයෝගයක් සුදුසු නොවේ. (03)
 NaOH - ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සෑදිය හැක. (01)
 NaNO₃ - අයන දෙකෙහි සවලතාව/සන්නායකතාවය වෙනස් ය. (01)
 ඇසිටික් අම්ලය - දුර්වල වශයෙන් අයනීකරණය වේ/අඩු සන්නායකතාවයක් ඇත. (01)

(iii) සඳහා විකල්ප පිළිතුර - 2

NaNO₃ පමණක් සුදුසු වේ. (03)

එහි සන්තායකතාව ඉහළ වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවලට සහභාගී නොවේ. (03)

(iv) නිවැරදි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යුගල තෝරා ගැනීම සඳහා (03)



(භෞතික අවස්ථා සහ ස්ටොයිකියොමිතිය නිවැරදි විය යුතුය.)

ආරම්භක (mol dm ⁻³)	1.0	1.0
t කාලයකට පසුව (mol dm ⁻³)	(1-3x/V)	(1+2x/V)
V = පරිමාව වේ.	(02)	(02)

$$[Al^{3+}] = 1 + 2x/V = c \quad (03)$$

$$x/V = (c-1)/2$$

$$[Cu^{2+}] = 1 - 3(c-1)/2 \quad (03)$$

$$= (5-3c)/2$$

හෝ

නිවැරදි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යුගල තෝරා ගැනීම සඳහා (03)

$$t \text{ කාලය තුළ දී } [Al^{3+}] \text{ සාන්ද්‍රණයේ වැඩිවීම} = c_1 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{එවිට } [Al^{3+}] = 1 + c_1 = c \quad (03)$$

$$t \text{ කාලය තුළ දී } [Cu^{2+}] \text{ සාන්ද්‍රණයේ වෙනස්වීම} = 3c_1/2 \text{ mol dm}^{-3} \quad (03)$$

$$\text{එමනිසා, } [Cu^{2+}] = 1 - 3c_1/2 \quad (03)$$

$$= 1 - 3(c-1)/2 \quad (03)$$

$$= (5-3c)/2$$

10(b) : ලකුණු 75

10 සඳහා මුළු ලකුණු 150