


2.2.3. II ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි ප්‍රශ්න සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා

(10) සංයුක්ත ගණිතය II - A කොටස

1 වන ප්‍රශ්නය

1. ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක් හා ස්කන්ධය λm වූ Q අංශුවක් පිළිවෙළින් u හා v වේගවලින් එකිනෙක දෙසට, සුමට තිරස් ගෙඩිමක් මත වූ එක ම සරල රේඛාවක් දිගේ චලනය වේ. ඒවායේ ගැටුමෙන් පසු, P අංශුව v වේගයෙන් හා Q අංශුව u වේගයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට චලනය වේ. $\lambda=1$ බව පෙන්වා, P හා Q අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය සොයන්න.



පද්ධතියට $I = \Delta(Mv) \longrightarrow$ යෙදීමෙන්

$$0 = (\lambda mu - mv) - (mu - \lambda mv) \quad (5)$$

$$\Rightarrow 0 = (\lambda - 1)u + (\lambda - 1)v$$

$$\Rightarrow 0 = (\lambda - 1)(u + v) \quad (5)$$

$$\Rightarrow \lambda = 1.$$

e යෙදීමෙන් P හා Q අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය යැයි ගනිමු. නිව්ටන් ප්‍රත්‍යාගති නියමය යෙදීමෙන් :

$$(u + v) = e(u + v) \quad (10) \quad \begin{matrix} \longrightarrow u & \longrightarrow -v \\ \longrightarrow -v & \longrightarrow u \end{matrix}$$

$$\therefore e = 1. \quad (5)$$


25

1 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 97%ක් වන අතර මෙහි පහසුතාව 66%කි. අංශු දෙකක චලනය සඳහා ආවේගය = ගම්‍යතා පරිවර්තනය හෝ රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය සහ නිව්ටන්ගේ පරීක්ෂණාත්මක නියමය නිවැරදිව යෙදීම මෙයින් අපේක්ෂා කෙරේ. ඉහත සමීකරණ ලිවීමේදී දිශාව නිවැරදිව නොසැලකීම නිසා සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය හා නිව්ටන්ගේ පරීක්ෂණාත්මක නියමය භාවිතයෙන් සරල ගැටලු විසඳීමට සිසුන්ව හුරු කරවීමෙන් මෙම දුර්වලතා මඟ හරවා ගත හැකිය.

2 වන ප්‍රශ්නය

2. කුඩා ඒකාකාර බෝලයක් රැගත් බැලුනයක් කාලය $t=0$ දී පොළොව මත ලක්ෂ්‍යයකින් නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ කර ඒකාකාර f ත්වරණයකින් සිරස් ව ඉහළට චලනය වේ; මෙහි $f < g$ වේ. කාලය $t=T$ හි දී බෝලය, බැලුනයෙන් සිරුවෙන් ඉවත් වී ගුරුත්වය යටතේ චලනය වේ. $t=0$ සිට බෝලය එහි උපරිම උස කරා ළඟා වන තෙක් බෝලයේ උඩු අත් වලිතය සඳහා ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්තාරයේ දළ සටහනක් අඳින්න. T , f හා g ඇසුරෙන්, බෝලය ළඟා වූ උපරිම උස සොයන්න.



$$f = \frac{AC}{T} \quad \text{සහ} \quad g = \frac{AC}{BC} \Rightarrow BC = \frac{f}{g} T. \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \text{උපරිම උස} = OAB \text{ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය} &= \frac{1}{2} \left(T + \frac{fT}{g} \right) \times fT. \quad (5) \quad (5) \\ &= \frac{fT^2}{2g} (f + g) \end{aligned}$$

25



2 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 92%ක් පමණි. අංශුවක වලිතය සඳහා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාර ඇඳීම සහ එහි භාවිතය මින් අපේක්ෂා කරන අතර එහි පහසුතාව 44%ක් පමණි.

ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාර ඇඳීමේදී බෝලයේ වලිත දිශා නොසලකා තිබීමෙන් සාර්ථක පිළිතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. ඒ සඳහා සිසුන්ව සරල අභ්‍යාසවල නිරත කරවීමෙන් මෙම දුර්වලතා මග හරවා ගත හැකිය.

3 වන ප්‍රශ්නය

3. රූපයේ $PABCD$ යනු තිරසර 30° කින් ආනත අවල සුමට තලයක් මත තබා ඇති ස්කන්ධය m වූ අංශුවකට ඇඳා ඇති සැහැල්ලු අවිනන්‍ය තන්තුවකි, තන්තුව, A හි වූ අවල කුඩා සුමට කප්පියක් මතින් ද ස්කන්ධය $2m$ වූ සුමට කප්පියක් යටින් ද යයි. D ලක්ෂ්‍යය අවල වේ. PA , උපරිම බැවුම් රේඛාවක් දිගේ වන අතර AB හා CD සිරස් වේ. තන්තුව තදව ඇතිව පද්ධතිය නිශ්චලතාවයේ සිට මුදාහරිනු ලැබේ. අංශුවේ ත්වරණයෙහි විශාලත්වය සවල කප්පියේ ත්වරණයෙහි විශාලත්වය මෙන් දෙගුණයක් බව පෙන්වා, තන්තුවේ ආතතිය නිර්ණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලියා දක්වන්න.



$x + 2y = \text{නියතයක්} \Rightarrow \ddot{x} + 2\ddot{y} = 0 \Rightarrow 2\ddot{y} = -\ddot{x}$ (5)

රූපයේ පරිදි f හා F සමගින් $f = 2F$ වේ. (5)

$\underline{F} = m\underline{a}$ ↗ for P : $T - mg \sin 30^\circ = m f$ (5)

$\underline{F} = m\underline{a}$ ↓ for $2mg$: $2mg - 2T = 2m F$ (5)

25


3 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 89%ක් පමණි. නිව්ටන්ගේ නියම ($\mathbf{F} = m\mathbf{a}$) යෙදීම මින් අපේක්ෂා කරන අතර එහි පහසුතාව 48%ක් පමණ වේ.

අංශුවේ සහ කප්පියේ ත්වරණ අතර සම්බන්ධතාවය නිවැරදිව ලබා නොගැනීම නිසා සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගැනීමට අපහසු වී තිබුණි. ඉහත ආකාරයේ සරල ගැටලු විසඳීමට යොමු කිරීමෙන් මෙම දුර්වලතා මඟ හරවා ගත හැකිය.

4 වන ප්‍රශ්නය

4. ස්කන්ධය M kg වූ ට්‍රැක් රථයක් ස්කන්ධය m kg වූ කාරයක් සෘජු තිරස් පාරක් දිගේ ඇදගෙන යනු ලබන්නේ ට්‍රැක් රථයේ හා කාරයේ වලිත දිශාවට සමාන්තර වූ සැහැල්ලු අවිතනා කේබලයක් ආධාරයෙනි. ට්‍රැක් රථයේ හා කාරයේ වලිතයට ප්‍රතිරෝධ පිළිවෙලින් නිව්ටන λM හා නිව්ටන λm වේ; මෙහි $\lambda (>0)$ නියතයකි. එක්තරා මොහොතක දී ට්‍රැක් රථයේ එන්ජිමෙන් ජනනය කරනු ලබන ජවය P kW වන අතර ට්‍රැක් රථයෙහි හා කාරයෙහි වේගය v ms⁻¹ වේ. එම මොහොතේ දී කේබලයේ ආතතිය නිව්ටන $\frac{1000mP}{(M+m)v}$ බව පෙන්වන්න.



ප්‍රකර්ෂණ බලය : $F = \frac{1000P}{v} N$ ----- (1) (5)

$F = ma \rightarrow$ for M : $F - \lambda M - T = M f$ ----- (2) (5)

$F = ma \rightarrow$ for m : $T - \lambda m = m f$ ----- (3) (5)

ඇන් (1), (2) හා (3) $\Rightarrow \frac{1000P}{v} - \lambda M - T = M f$

$\Rightarrow \frac{1000P}{v} - \lambda M - T = \frac{M}{m}(T - \lambda m)$

$\Rightarrow T = \frac{1000mP}{(M+m)v} N.$ (5)

25

4 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 93%ක් පමණි. නිව්ටන් නියම $F = ma$ හා ක්ෂමතාව සඳහා $P = FV$ යන සමීකරණවල යෙදීම් පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම මෙයින් අපේක්ෂා කරන අතර එහි පහසුතාව 47%කි.

නිවැරදි බල ලකුණු කිරීම හා ඒවා සාර්ථකව සමීකරණවල යොදා නොගැනීම නිසා දී ඇති පිළිතුරට ළඟා වීමට නොහැකි වී ඇත. මෙවැනි සරල ගැටලු විසඳීමේදී නිවැරදි බල ලකුණු කිරීමට සහ සමීකරණවල යෙදීම් පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ගැටලු විසඳීමට යොමු කළ යුතුය.

5 වන ප්‍රශ්නය

5. සුපුරුදු අංකනයෙන්, $-i+2j$ හා $2\alpha i+\alpha j$ යනු පිළිවෙලින් O අවල මූලයකට අනුබද්ධයෙන් A හා B ලක්ෂ්‍ය දෙකක පිහිටුම් දෛශික යැයි ගනිමු; මෙහි $\alpha(>0)$ නියතයකි. අදිශ ගුණිතය භාවිතයෙන්, $\hat{A}OB = \frac{\pi}{2}$ බව පෙන්වන්න.

C යනු $OACB$ සෘජුකෝණාස්‍රයක් වන පරිදි වූ ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු. \vec{OC} දෛශිකය y -අක්ෂය දිගේ පිහිටයි නම්, α හි අගය සොයන්න.

$$\begin{aligned} \text{තින් ගුණිතය} \therefore \vec{OA} \cdot \vec{OB} &= (-i+2j) \cdot (2\alpha i+\alpha j) \\ &= -2\alpha+2\alpha=0 \end{aligned}$$

(5)

$$\therefore \hat{A}OB = \frac{\pi}{2} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \vec{OC} &= \vec{OA} + \vec{AC} \\ &= \vec{OA} + \vec{OB} \end{aligned}$$

$$= (-1+2\alpha)i + (2+\alpha)j \quad (5)$$

$$\vec{OC} \text{ } y\text{-අක්ෂය මත පිහිටයි.} \Rightarrow (1-2\alpha) = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \quad (5)$$



25

5 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 91%ක් පමණි. දෛශික දෙකක අදිශ ගුණිතය පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම මෙයින් අපේක්ෂා කරන අතර එහි පහසුතාව 37%ක් පමණි. i සහ j ඒකක දෛශික ඇසුරෙන් දෛශික දෙකක අදිශ ගුණිතය ප්‍රකාශ කිරීම නිවැරදිව යොදා නොගැනීමෙන් බොහෝ අපේක්ෂකයින් අවසන් ප්‍රතිඵලයට ළඟා වී නොතිබුණි. අදිශ ගුණිතය පිළිබඳ විවිධ ගැටලු විසඳීමට යොමු කිරීමෙන් මෙම දුර්වලතාව මග හරවා ගත හැකිය.

6 වන ප්‍රශ්නය

6. OA හා OB සැහැල්ලු අවිභ්‍රාම තන්තු දෙකක් මගින් O අවල ලක්ෂ්‍යයකින් එල්ලන ලද දිග $2a$ හා බර W වූ AB ඒකාකාර දණ්ඩක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සමතුලිතතාවයේ පවතී. G යනු AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ. $\hat{AOB} = \frac{\pi}{2}$ හා $\hat{OAB} = \alpha$ බව දී ඇත. $\hat{AOG} = \alpha$ බව පෙන්වා, තන්තු දෙකෙහි ආතති සොයන්න.



$\hat{AOB} = \frac{\pi}{2}$, බැවින් A, O සහ B හරහා යන විෂ්කම්භය AB වන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය G වේ.

$\therefore AG = OG.$

$\Rightarrow \hat{AOG} = \hat{OAG} = \alpha .$ (5)

\vec{AO} හා \vec{BO} දිගේ විභේදනයෙන් (5)

$T_1 = W \cos \alpha .$ (5)

$T_2 = W \sin \alpha .$ (5)

25

6 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 87%ක් පමණි. ඒක තල බල තුනක ක්‍රියාව යටතේ දෘඪ වස්තුවක සමතුලිතතාව පිළිබඳ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම මෙම ප්‍රශ්නයෙන් අපේක්ෂා කර ඇති අතර එහි පහසුතාව 27%කි.

ජ්‍යාමිතික ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනා නොගැනීම නිසා නිවැරදි පිළිතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. ජ්‍යාමිතික ලක්ෂණ පිළිබඳ වැඩි අවධානය යොමු කරමින් ඒකතල බල තුනක සමතුලිතතාව පිළිබඳ ගැටලු විසඳීමට හුරු කරවීමෙන් මෙම දුර්වලතා මඟ හරවා ගත හැක.

7 වන ප්‍රශ්නය

7. A හා B යනු Ω නියැදි අවකාශයක සිද්ධි දෙකක් යැයි ගනිමු. පුපුරුදු අංකනයෙන්, $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$, $P(A' \cup B') = \frac{5}{6}$ හා $P(B | A) = \frac{1}{4}$ බව දී ඇත. $P(A)$ හා $P(B)$ සොයන්න.

$A' \cup B' = (A \cap B)'$, නිසා $P((A \cap B)') = 1 - P(A \cap B)$ වේ.

$\therefore P(A \cap B) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$. (5)

ඇත් $P(B | A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{6} \times 4 = \frac{2}{3}$. (5)

තවද, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow \frac{4}{5} = \frac{2}{3} + P(B) - \frac{1}{6}$

$\Rightarrow P(B) = \frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$. (5)

25

7 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 90%ක් වන අතර එහි පහසුතාව 58%කි. මෙය සරල සිද්ධිවල සම්භාවිතාව පිළිබඳ ප්‍රමේයයන් සහ අසම්භාව්‍ය සම්භාවිතාව පිළිබඳ යෙදීම් අපේක්ෂා කරන ගැටලුවකි. මෙහි $P(A \cup B)$ සඳහා වූ සම්බන්ධය සහ $P(A \setminus B)$ හි අර්ථ දැක්වීම පිළිබඳ දැනුම මඳකම නිසා ගැටලුවට සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.

සම්භාවිතාව පිළිබඳ මූලික ප්‍රමේයයන් නිවැරදිව යොදා ගැනීමෙන් හා සරල ගැටලු විසඳීමට යොමු කරවීමෙන් මෙම දුර්වලතා මඟ හරවා ගත හැකිය.


8 වන ප්‍රශ්නය

8. මල්ලක, කාඩ් නවයක් අඩංගු වේ. ඒවායින් හතරක 1 සංඛ්‍යාංකය මුද්‍රණය කර ඇති අතර ඉතිරි ඒවායේ 2 සංඛ්‍යාංකය මුද්‍රණය කර ඇත. ප්‍රතිස්ථාපන රහිත ව වරකට එක බැගින් සසම්භාවීව මල්ලෙන් කාඩ් ඉවතට ගනු ලැබේ.

(i) ඉවතට ගත් පළමු කාඩ් දෙකෙහි සංඛ්‍යාංකයන්හි එකතුව හතර වීමේ,

(ii) ඉවතට ගත් පළමු කාඩ් තුනෙහි සංඛ්‍යාංකයන්හි එකතුව තුන වීමේ,

සම්භාවිතාව සොයන්න.



(i) පිළිතුර $= \frac{5}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{18}$. 5

5

(ii) පිළිතුර $= \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{21}$. 5

10

25

8 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 86%ක් පමණි. මෙම ගැටලුව ද සම්භාවිතාවය පිළිබඳ සරල ගැටලුවක් වන අතර එහි පහසුතාව 38%ක් පමණි.

මෙහිදී සම්භාවිතාවේ ගුණන නීතිය නිවැරදිව යෙදීම පිළිබඳව අපේක්ෂා කෙරේ. සිද්ධි පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් නොමැති වීම සාර්ථක පිළිතුරු කරා ළඟා නොවීමට හේතු වී තිබුණි. සරල ගැටලු විසඳීමට යොමු කිරීමෙන් මෙම දුර්වලතා මඟ හරවා ගත හැකිය.

9 වන ප්‍රශ්නය

9. නිරීක්ෂණ හයක අගයන් a, a, b, b, x හා y වේ; මෙහි a, b, x හා y යනු ප්‍රතින්ත ධන නිඛිල වන අතර $a < b$ වේ. මෙම නිරීක්ෂණ හයෙහි මාතයන් මොනවා ද?

මෙම මාතයන්හි දේශීය හා ගුණිතය පිළිවෙලින් x හා y බව දී ඇත. නිරීක්ෂණ හයෙහි මධ්‍යන්‍යය $\frac{7}{2}$ වේ නම්, a හා b සොයන්න.

මාතයන් a හා b වේ. (5)

$a + b = x$ බව සහ $ab = y$ බව දී ඇත.

මධ්‍යන්‍යය $\frac{7}{2}$ නිසා, $\frac{2a + 2b + x + y}{6} = \frac{7}{2}$ වේ. (5)

$\therefore 3a + 3b + ab = 21$ ----- (1) (5)

(1) $\Rightarrow ab$ යන්න 3 න් බෙදෙන අතර $ab \geq 3$.

තවද (1) $\Rightarrow a + b \leq 6$. (5)

$1 \leq a < b$ නිසා

$a = 2$ $b = 3$ වේ. (5)

25

9 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :

මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 85%ක් පමණි. සංඛ්‍යානයේ එන කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් පිළිබඳ දැනුම මෙයින් අපේක්ෂා කරන අතර එහි පහසුතාව 37%ක් පමණි. දී ඇති අගයයන් අතර සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීමට හැකි වුවත්, දී ඇති අවශ්‍යතාවය සපුරාලන සේ a, b හි අගයන් සෙවීමට නොහැකි වී තිබුණි. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් සම්බන්ධ විවිධ ආකාරයේ සරල ගැටලු විසඳීමට සිසුන් යොමු කිරීමෙන් මෙම දුර්වලතාව මඟ හරවා ගත හැකිය.

10 වන ප්‍රශ්නය

10. x_1, x_2, \dots, x_{10} යන සංඛ්‍යා දහයෙහි මධ්‍යන්‍යය හා විචලතාව පිළිවෙළින් 10 හා 9 වේ. x_{10} සංඛ්‍යාව ඉවත් කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වන සංඛ්‍යා නවයෙහි ද මධ්‍යන්‍යය 10 බව දී ඇත. මෙම සංඛ්‍යා නවයෙහි විචලතාව සොයන්න.

$$\text{මධ්‍යන්‍යය} = 10 \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = 10. \quad (5)$$

$$\text{විචලතාව} = 9 \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i^2}{10} - 10^2 = 9 \Rightarrow \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 1090. \quad (5)$$

$$\text{පළමු සංඛ්‍යා 9 හි මධ්‍යන්‍යය} = 10 \Rightarrow x_{10} = 10. \quad (5)$$

$$\therefore \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 990. \quad (5)$$

$$\therefore \text{පළමු සංඛ්‍යා 9හි විචලතාව} = \frac{990}{9} - 10^2 = 10. \quad (5)$$

25

10 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ හා නිගමන :


මෙම ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් වුවත් පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ 78%ක් පමණි. අසම්පූර්ණ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක මධ්‍යන්‍යය හා විචලතාව පිළිබඳ දැනුම මෙයින් අපේක්ෂා කරන අතර එහි පහසුතාව 26%ක් පමණි.

විචලතාවය පිළිබඳ සමීකරණය නිවැරදිව යොදා ගැනීම දුර්වල මට්ටමක පැවතීම නිසා සාර්ථකව පිළිතුරු කරා ළඟා වීමට අපොහොසත් වී තිබුණි. මධ්‍යන්‍යය හා විචලතාවය ඇතුළත් වන පරිදි විවිධ ගැටලු විසඳීමට සිසුන්ට හුරු කරවීම මගින් මෙම දුර්වලතාව මඟ හරවා ගත හැකිය.

(10) සංයුක්ත ගණිතය II - B කොටස

11 වන ප්‍රශ්නය

11. (a) උස a වූ සිරස් කුළුණක පාදය, තිරස් පොළොව මත වූ අරය $2a$ වන වෘත්තාකාර පොකුණක C කේන්ද්‍රයෙහි ඇත. කුළුණ මුදුනේ සිට තිරසෙන් ඉහළට $\frac{\pi}{4}$ කෝණයකින් u වේගයක් සහිත ව කුඩා ගලක් ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. (රූපය බලන්න.) ගල, ගුරුත්වය යටතේ නිදහසේ චලනය වී C සිට R දුරකින් C හරහා වූ තිරස් තලයෙහි වැටේ. $gR^2 - u^2R - u^2a = 0$ සමීකරණය මගින් R දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.




u, a හා g ඇසුරෙන් R සොයා, $u^2 > \frac{4}{3}ga$ නම්, ගල පොකුණ තුළට නොවැටෙන බව අපෝහනය කරන්න.

(b) S නැවක් පොළොවට සාපේක්ෂව $u \text{ km h}^{-1}$ ඒකාකාර වේගයෙන් නැගෙනහිර දිශාවට යාත්‍රා කරයි. B බෝට්ටුවක සිට බටහිරින් දකුණට θ කෝණයකින් $l \text{ km}$ දුරක නැව තිබෙන මොහොතේ දී බෝට්ටුව, නැව හමුවන අපේක්ෂාවෙන්, පොළොවට සාපේක්ෂව $v \text{ km h}^{-1}$ ඒකාකාර වේගයෙන් සරල රේඛීය පෙතක ගමන් කරයි; මෙහි $u \sin \theta < v < u$ වේ. නැව හා බෝට්ටුව ඒවායේ වේග හා පෙත් නොවෙනස්ව පවත්වා ගන්නේ යැයි උපකල්පනය කරමින්, පොළොවට සාපේක්ෂව බෝට්ටුවට ගත හැකි පෙත් දෙක නිර්ණය කිරීම සඳහා ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණවල දළ සටහන් එක ම රූපයක අඳින්න.

පොළොවට සාපේක්ෂව බෝට්ටුවට ගත හැකි වලින දිශා දෙක අතර කෝණය $\pi - 2\alpha$ බව පෙන්වන්න; මෙහි $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{u \sin \theta}{v}\right)$ වේ.

මෙම පෙත් දෙක දිගේ නැව හමුවීම සඳහා බෝට්ටුව ගනු ලබන කාල, පැය t_1 හා පැය t_2 යැයි ගනිමු.

$$t_1 + t_2 = \frac{2lu \cos \theta}{u^2 - v^2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$



$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \text{ යෙදීමෙන්,}$$

$$\rightarrow A \text{ සිට } B \text{ දක්වා : } R = u \cos \frac{\pi}{4} \cdot t = \frac{ut}{\sqrt{2}} \text{----- (1) } \textcircled{5}$$

$$\uparrow A \text{ සිට } B \text{ දක්වා : } -a = u \sin \frac{\pi}{4} t - \frac{1}{2}gt^2 \text{----- (2) } \textcircled{10}$$

$$(1) \text{ හා } (2) \Rightarrow -a = R - \frac{1}{2}g \frac{2R^2}{u^2} \text{ } \textcircled{5}$$

$$\Rightarrow gR^2 - u^2R - u^2a = 0 \text{ } \textcircled{5}$$

$$\therefore R = \frac{u^2 \pm \sqrt{u^4 + 4u^2 ag}}{2g} \quad (5)$$

$$R = \frac{u^2 + \sqrt{u^4 + 4agu^2}}{2g} \quad (5) \quad (\because R > 0) \quad (5)$$

15

$$u^2 > \frac{4}{3}ga. \quad \text{ලෙස ගනිමු.}$$

$$\text{එවිට } R > \frac{\frac{4}{3}ga + \sqrt{\frac{16}{9}g^2a^2 + \frac{16}{3}g^2a^2}}{2g} = \frac{\frac{4}{3}ga + \frac{8}{3}ga}{2g} = 2a. \quad (5)$$

$$\Rightarrow R > 2a.$$

ගල පොකුණට නොවැටේ.

10

$$(b) \quad \underline{V}(S, E) = u \quad (5)$$

$$\underline{V}(B, E) = v \quad (5)$$


$$\underline{V}(B, S) = \quad (5)$$

$$\underline{V}(B, S) = \underline{V}(B, E) + \underline{V}(E, S)$$

$$= \underline{V}(E, S) + \underline{V}(B, E) \quad (5)$$

$$= \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}$$

$$= \overrightarrow{PR}.$$



$$\text{අවශ්‍ය කෝණය} = R_1\hat{Q}R_2 \quad (5)$$

$$= \pi - 2\alpha, \quad \text{මෙහි } QR_2R_1 = \alpha. \quad (5)$$

$$\sin \alpha = \frac{QA}{QR_2} = \frac{u \sin \theta}{v}, \quad (5)$$

$$\therefore \alpha = \sin^{-1} \left(\frac{u \sin \theta}{v} \right).$$

15

$$t_1 + t_2 = \frac{l}{PR_1} + \frac{l}{PR_2} = \frac{l(PR_1 + PR_2)}{PR_1 \cdot PR_2}.$$

(5)

$$PR_1 = PA - AR_1$$

$$= u \cos \theta - \sqrt{v^2 - u^2 \sin^2 \theta} \quad (10)$$

$$PR_2 = PA + AR_2$$

$$= u \cos \theta + \sqrt{v^2 - u^2 \sin^2 \theta} \quad (10)$$


$$\therefore t_1 + t_2 = \frac{l \cdot 2u \cos \theta}{u^2 \cos^2 \theta - (v^2 - u^2 \sin^2 \theta)} \quad (5)$$

$$= \frac{2lu \cos \theta}{u^2 - v^2} (\because \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1) \quad (5)$$

35

12 වන ප්‍රශ්නය

12.(a) රූපයෙහි දැක්වෙන ABCD ක්‍රමිකය, ස්කන්ධය $2m$ වූ සුමට ඒකාකාර කුට්ටියක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඔස්සේ යන සිරස් තරස්කඩකි. AD හා BC රේඛා සමාන්තර වන අතර AB රේඛාව එය අඩංගු මුහුණතෙහි උපරිම බැඳුම් රේඛාවක් වේ. තව ද $AB = 2a$ ද $\hat{BAD} = \alpha$ ද වේ; මෙහි $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ හා $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ වේ. AD අයත් මුහුණත සුමට තිරස් ගෙඩීමක් මත ඇතිව කුට්ටිය තබනු ලබයි. දිග $l (> 2a)$ වූ සැහැල්ලු




අවිභන්‍ය තන්තුවක් B හි පිහිටි කුඩා සුමට කප්පියක් උඩින් යන අතර එහි එක් කෙළවරකට ස්කන්ධය m වූ P අංශුවක් ද අනෙක් කෙළවරට එම m ස්කන්ධය ම සහිත වෙනත් Q අංශුවක් ද ඇඳා ඇත. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි P අංශුව AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ ද Q අංශුව BC මත ද තබා තන්තුව තදව ඇතිව පද්ධතිය නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ.

ගෙඩීමට සාපේක්ෂව කුට්ටියේ ත්වරණය $\frac{4}{17}g$ බව පෙන්වා, කුට්ටියට සාපේක්ෂව P හි ත්වරණය සොයන්න.


තව ද P අංශුව A කරා ළඟා වීමට ගන්නා කාලය $\sqrt{\frac{17a}{5g}}$ බව පෙන්වන්න.

(b) එක එකක ස්කන්ධය m වූ A හා B අංශු දෙකක් දිග $l (> 2\pi a)$ වූ සැහැල්ලු අවිභන්‍ය තන්තුවක දෙකෙළවරට ඇඳනු ලැබේ. ස්කන්ධය $2m$ වූ C අංශුවක් තන්තුවේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට ඇඳනු ලැබේ. කේන්ද්‍රය O හා අරය a වූ අවල සුමට ගෝලයක උච්චතම ලක්ෂ්‍යයෙහි C අංශුව ඇතිව ද A හා B අංශු O කුළුන් වූ සිරස් තලයක නිදහසේ ඵල්ලෙමින් ද රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තන්තුව ගෝලය මතින් තබා ඇත. සරල රේඛීය පෙතක A අංශුව පහළට චලනය වන පරිදි C අංශුවට ගෝලය මත එම සිරස් තලයේ ම කුඩා විස්ථාපනයක් දෙනු ලැබේ. C අංශුව ගෝලය සමඟ ස්පර්ශව ඇතිනිකක් $\theta^2 = \frac{g}{a}(1 - \cos \theta)$ බව පෙන්වන්න; මෙහි θ යනු OC හැරී තිබෙන කෝණය වේ.



$\theta = \frac{\pi}{3}$ වන විට C අංශුව, ගෝලය අතහැර යන බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.

(a)



$\underline{a}(P, \text{Block}) = f \swarrow$ යැයි ගනිමු. එවිට $\underline{a}(Q, \text{Block}) = f \longleftarrow$

තවද $\underline{f}(\text{Block}, E) = F \longrightarrow$

$\underline{F} = m\underline{a}$: යෙදීමෙන්

$$\text{පද්ධතියට} \rightarrow 0 = 2mF + m(F - f) + m(F - f \cos \alpha) \quad (10)$$

$$\Rightarrow 0 = 4F - f - f \times \frac{3}{5}$$

$$\therefore f = \frac{5F}{2} \text{ ----- (1)} \quad (5)$$

$$P \text{ අංශුවට} \swarrow mg \sin \alpha - T = m(f - F \cos \alpha) \text{ ----- (2)} \quad (10)$$

$$Q \text{ අංශුවට} \leftarrow T = m(f - F) \text{ ----- (3)} \quad (10)$$

$$(2) + (3) \Rightarrow mg \times \frac{4}{5} = m(f - F) + m\left(f - F \times \frac{3}{5}\right) \quad (5)$$

$$\Rightarrow 4g = 5f - 5F + 5f - 3F$$

$$\Rightarrow 4g = 10f - 8F \quad (5)$$

$$\text{දැන් (1)} \Rightarrow 4g = 25F - 8F$$

$$\Rightarrow F = \frac{4}{17}g. \quad (5)$$

$$(1) \Rightarrow f = \frac{10g}{17}. \quad (5)$$

70

$s = ut + \frac{1}{2}at^2$: \swarrow යෙදීමෙන්



$$(P, B) \text{ හි චලිතය සඳහා} : a = 0 + \frac{1}{2}ft^2 \quad (5)$$

(5)

$$\therefore t = \sqrt{\frac{2a}{10g}} = \sqrt{\frac{17a}{5g}}$$

10

(b)



ශක්ති සංස්ථිති නියමයෙන්

$$\frac{1}{2} \times 2m \times (a\dot{\theta})^2 + 2 \times \frac{1}{2} \times m \times (a\dot{\theta})^2 + 2mga \cos\theta - mg(k - a\theta) - mg(k + a\theta) = 2mgk + 2mga$$

(25) { PE 10
KE 10
Equation 5

$$\Rightarrow 2a\dot{\theta}^2 = -2g \cos\theta + 2g \quad (10)$$

$$\therefore \theta^2 = \frac{g}{a}(1 - \cos\theta).$$

45

$\underline{F} = m\underline{a}$:

C සඳහා \nearrow ; $R - 2mg \cos\theta = -2m \cdot a\dot{\theta}^2 \quad (10)$

$$\Rightarrow R = 2mg \cos\theta - 2mg(1 - \cos\theta)$$

$$= 2mg(2\cos\theta - 1). \quad (5)$$

$$\Rightarrow \theta \text{ වැඩි වන විට } R \text{ අඩු වන අතර } \cos\theta = \frac{1}{2} \text{ වන විට } R = 0 \text{ වේ.} \quad (5)$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3} \text{ වන විට } C \text{ ගෝලය හැර යයි.} \quad (5)$$

25

13 වන ප්‍රශ්නය

13. ස්වාභාවික දිග a හා ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාසාංකය mg වූ සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක එක් කෙළවරක් සුමට තිරස් ගෙබිම්කට $3a$ උසක් ඉහළින් වූ O අවල ලක්ෂ්‍යයකට ඇඳා ඇති අතර අනෙක් කෙළවර ස්කන්ධය m වූ අංශුවකට ඇඳා ඇත. අංශුව O අසලින් තබා, \sqrt{ga} වේගයකින් සිරස් ව පහළට ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. තන්තුවේ දිග x යන්න, $a \leq x < 3a$ සඳහා $\ddot{x} + \frac{g}{a}(x - 2a) = 0$ සමීකරණය සපුරාලන බව පෙන්වා මෙම සරල අනුවර්තී චලිතයෙහි කේන්ද්‍රය සොයන්න.

ගෙබිම සමග පළමු ගැටුම තෙක් අංශුවේ පහළට චලිතය සඳහා ශක්ති සංස්ථිති මූලධර්මය යෙදීමෙන් $a \leq x < 3a$ සඳහා $\dot{x}^2 = \frac{g}{a}(4ax - x^2)$ බව පෙන්වන්න.

$X = x - 2a$ යැයි ගනිමින් අවසාන සමීකරණය $-a \leq X < a$ සඳහා $\dot{X}^2 = \frac{g}{a}(A^2 - X^2)$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි A යනු නිර්ණය කළ යුතු විස්තාරය වේ.

ගෙබිම සමග පළමු ගැටුමට මොහොතකට පෙර අංශුවේ ප්‍රවේගය කුමක් ද?

අංශුව හා ගෙබිම අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය $\frac{1}{\sqrt{3}}$ වේ. පළමු ගැටුමෙන් පසු තන්තුව බුරුල් වන තෙක් අංශුවේ උඩු අත් චලිතයට $-a \leq X < a$ සඳහා $\dot{X}^2 = \frac{g}{a}(B^2 - X^2)$ බව දී ඇත; මෙහි B යනු මෙම නව සරල අනුවර්තී චලිතයේ නිර්ණය කළ යුතු විස්තාරය වේ.

ඉහතින් විස්තර කරන ලද යටි අත් හා උඩු අත් සරල අනුවර්තී චලිතවල අංශුව යෙදෙන මුළු කාලය $\frac{5\pi}{6} \sqrt{\frac{a}{g}}$ බව පෙන්වන්න.

$a \leq x < 3a$: සඳහා

$$T = \frac{mg}{a}(x - a) \quad (5)$$

$F = ma$: යෙදීමෙන්

$$m \text{ සඳහා } m \downarrow; mg - T = m \ddot{x} \quad (10)$$

$$\Rightarrow mg - \frac{mg}{a}(x - a) = m \ddot{x}$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{g}{a}(x - 2a) = 0 \quad (5)$$


$\ddot{x} = 0$ මගින් කේන්ද්‍රය දෙනු ලැබේ. i.e. $x = 2a$.

(5)

එම නිසා C , හි කේන්ද්‍රය පවතී. මෙහි C යනු

(5)

$OC = 2a$ වූ O ට සිරස්ව පහලින් පිහිටන ලක්ෂ්‍යයයි.



35

$$\text{ශක්ති සංස්ථිතියෙන්} : \frac{1}{2}m(ga) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - mgx + \frac{1}{2}mg\frac{(x-a)^2}{a} \quad (20)$$

$$ga = \dot{x}^2 - 2gx + \frac{g}{a}(x^2 - 2ax + a^2)$$

$$\dot{x}^2 = ga + 2gx - \frac{g}{a}x^2 + 2gx - ga$$

$$\dot{x}^2 = \frac{g}{a}(4ax - x^2) \text{ for } a \leq x < 3a \quad (5)$$

25

$$X = x - 2a \Rightarrow \dot{X} = \dot{x} \quad (5)$$

$$\text{තවද } a \leq x < 3a \Leftrightarrow -a \leq X < a.$$

$$\dot{X}^2 = \frac{g}{a}\{4a(X+2a) - (X+2a)^2\} \quad (5)$$

$$= \frac{g}{a}\{4a^2 - X^2\} \text{ for } -a \leq X < a \quad (5)$$

$$\therefore A = 2a. \quad (5)$$

20

↓ v යනු ගැටුමට පෙර අංශුවේ ප්‍රවේගය ලෙස ගන්න.

$$\text{එවිට } v^2 = \frac{g}{a}(4a^2 - a^2) = 3ga \quad (5)$$

$$\therefore v = \sqrt{3ga} \quad (5)$$

10

නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමයෙන් ගැටුමට පසු ප්‍රවේගය $\uparrow = \sqrt{ga} \left(\because e = \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$ (10)

$$\dot{X}^2 = \frac{g}{a}(B^2 - X^2)$$


$$X = a \text{ වන විට } \dot{X} = \sqrt{ga} \text{ වේ.}$$

$$ga = \frac{g}{a}(B^2 - a^2) \quad (5)$$

$$\Rightarrow B = \sqrt{2}a. \quad (5)$$

20

10



15

$$\sqrt{\frac{g}{a}}t_1 = \frac{\pi}{3} \quad \text{නිසා} \quad t_1 = \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{a}{g}} \quad \text{වේ.} \quad \text{5}$$

$$\sqrt{\frac{g}{a}}t_2 = \frac{\pi}{2} \quad \text{නිසා} \quad t_2 = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{a}{g}} \quad \text{වේ.} \quad \text{5}$$

$$\therefore t_1 + t_2 = \frac{5\pi}{6} \sqrt{\frac{a}{g}}. \quad \text{5}$$

40

14 වන ප්‍රශ්නය

14. (a) A හා B සමග ඒක රේඛීය නොවන O අවල මූලයක් අනුබද්ධයෙන් A හා B ප්‍රතින්ත ලක්ෂ්‍ය දෙකක පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙලින් \mathbf{a} හා \mathbf{b} වේ. O අනුබද්ධයෙන් C ලක්ෂ්‍යයක පිහිටුම් දෛශිකය $\mathbf{c} = (1 - \lambda)\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ යැයි ගනිමු; මෙහි $0 < \lambda < 1$ වේ.

\overrightarrow{AC} හා \overrightarrow{CB} දෛශික \mathbf{a}, \mathbf{b} හා λ ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.

ඒ නගිත්, C ලක්ෂ්‍යය AB රේඛා බණ්ඩය මත පිහිටන බවත් $AC : CB = \lambda : (1 - \lambda)$ බවත් පෙන්වන්න.


දැන්, OC රේඛාව AOB කෝණය සමවිච්ඡේදනය කරන්නේ යැයි සිතමු. $|\mathbf{b}|(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) = |\mathbf{a}|(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$ බව පෙන්වා

ඒ නගිත්, λ සොයන්න.

(b) රූපයෙහි $ABCD$ යනු $AB = 1$ m හා $BC = \sqrt{3}$ m වූ සෘජුකෝණාස්‍රයක් වන අතර CDE යනු සමපාද ත්‍රිකෝණයකි. විශාලත්වය නිව්ටන $5, 2\sqrt{3}, 3, 4\sqrt{3}$, P හා Q වූ බල පිළිවෙලින් BA, DA, DC, CB, CE හා DE දිගේ අක්ෂර අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙන දිශාවලට ක්‍රියාකරයි. මෙම බල පද්ධතිය යුග්මයකට උභයනය වේ.

$P = 4$ හා $Q = 8$ බව පෙන්වා, මෙම යුග්මයේ සුර්ණය සොයන්න. දැන්, BA හා DA දිගේ ක්‍රියාකරන බලවල විශාලත්ව එලෙසම තිබිය දී ඒවායේ දිශා ප්‍රතිවර්තය කරනු ලැබේ. නව පද්ධතිය විශාලත්වය නිව්ටන $2\sqrt{37}$ සහිත තනි සම්ප්‍රයුක්ත බලයකට උභයනය වන බව පෙන්වන්න.

මෙම සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියාරේඛාව දික් කල BA හමුවන ලක්ෂ්‍යයට A සිට ඇති දුර $\frac{7}{4}$ m බව තවදුරටත් පෙන්වන්න.



(a) $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ සහ $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \mathbf{c} - \mathbf{a} = (1 - \lambda)\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} - \mathbf{a}$$

$$= \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{a})$$

$$\overrightarrow{CB} = \mathbf{b} - \mathbf{c} = \mathbf{b} - (1 - \lambda)\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}$$

$$= (1 - \lambda)(\mathbf{b} - \mathbf{a})$$


25

$$\overrightarrow{AC} = \frac{\lambda}{(1 - \lambda)} \overrightarrow{CB}$$

$\therefore C$ යන්න AB මත පිහිටන අතර $\frac{AC}{CB} = \frac{\lambda}{(1 - \lambda)}$

i. e. $AC : CB = \lambda : (1 - \lambda)$

15



$$\widehat{BOC} = \widehat{AOC}$$

$$\underline{a} \cdot \underline{c} = |\underline{a}| |\underline{c}| \cos \alpha \quad (5)$$

$$\underline{b} \cdot \underline{c} = |\underline{b}| |\underline{c}| \cos \alpha \quad (5)$$

$$\Rightarrow \frac{\underline{a} \cdot \underline{c}}{|\underline{a}|} = \frac{\underline{b} \cdot \underline{c}}{|\underline{b}|} \quad (5)$$

$$\Rightarrow |\underline{b}|(\underline{a} \cdot \underline{c}) = |\underline{a}|(\underline{b} \cdot \underline{c}) \quad (5)$$

20

(5)

$$\Rightarrow |\underline{b}| \{ (1-\lambda)|\underline{a}|^2 + \lambda \underline{a} \cdot \underline{b} \} = |\underline{a}| \{ (1-\lambda) \underline{a} \cdot \underline{b} + \lambda |\underline{b}|^2 \} \quad (5)$$

(5)


$$(1-\lambda)|\underline{a}| \{ |\underline{a}||\underline{b}| - \underline{a} \cdot \underline{b} \} = \lambda |\underline{b}| \{ |\underline{a}||\underline{b}| - \underline{a} \cdot \underline{b} \}$$

$$(1-\lambda)|\underline{a}| = \lambda |\underline{b}|$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{|\underline{a}|}{|\underline{a}| + |\underline{b}|}. \quad (\because \underline{a} \text{ හා } \underline{b} \text{ ප්‍රභින්න සහ එක රේඛීය නොවේ.)$$

15

(b)



පද්ධතිය යුග්මයකට උභයනය වන නිසා,

$$\rightarrow 3 - 5 + Q \cos 60^\circ - P \cos 60^\circ = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow P - Q = -4, \text{ සහ } (5)$$


$$\uparrow -2\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + Q \sin 60^\circ + P \sin 60^\circ = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow P + Q = 12 \quad (5)$$

$$\therefore P = 4 \text{ සහ } Q = 8. \quad (5)$$

$$\curvearrowleft \text{ යුග්මයේ ඝූර්ණය } = 7\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (10)$$

45



$$\rightarrow X = 5 + 3 + 8 \cos 60^\circ - 4 \cos 60^\circ = 10 \quad (5)$$

$$\uparrow Y = 2\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 8 \sin 60^\circ + 4 \sin 60^\circ = 4\sqrt{3} \quad (5)$$

$$R = \sqrt{100 + 48} = 2\sqrt{37} \quad (5)$$

15

H යනු දික් කල BA , සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාව හමුවන ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු.



$$-6\sqrt{3} + 2\sqrt{3}(1+a) + \sqrt{3}(3+4-2) = 0 \quad (10)$$


$$-6a + 2 + 2a + 5 = 0$$

$$a = \frac{7}{4} m. \quad (5)$$


15

15 වන ප්‍රශ්නය

15. (a) බර W හා පැත්තක දිග $2a$ වන ඒකාකාර ඝනකාකාර කුට්ටියක් රළ තිරස් ගෙබිමක් මත තබා ඇත. බර $2W$ හා දිග $2a$ වූ ඒකාකාර AB දණ්ඩක A කෙළවර තිරස් ගෙබිමෙහි ලක්ෂ්‍යයකට සුමට ලෙස අසව කර ඇති අතර B කෙළවර ඝනකයේ සුමට සිරස් මුහුණතකට එරෙහිව එහි කේන්ද්‍රයේ තබා ඇත. දණ්ඩ ඔස්සේ යන සිරස් තලය කුට්ටියේ එම සිරස් මුහුණතට ලම්බ වන අතර පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ පවතී. (අදාළ සිරස් හරස්කඩ සඳහා රූපය බලන්න.) ඝනකාකාර කුට්ටිය හා රළ තිරස් ගෙබිම අතර සර්ඝණ සංගුණකය μ වේ. $\mu \geq \sqrt{3}$ බව පෙන්වන්න.




(b) කෙළවරවලින් නිදහසේ සන්ධි කරන ලද AB , BC , AD , BD හා CD සැහැල්ලු දඬු පහකින් සමන්විත රාමු සැකිල්ලක් රූපයේ පෙන්වයි. $AB =$ මීටර a හා $BC =$ මීටර $2a$ වන අතර $\hat{B}AD = \hat{B}DA = \hat{B}CD = 30^\circ$ වේ. රාමු සැකිල්ලට B හි දී 150 N හා D හි දී 300 N භාර යොදා ඇත. එය AB හා BC තිරස් වන පරිදි පිළිවෙලින් A හා C හි දී යොදන ලද P හා Q සිරස් බල දෙකකින් ආධාර කරනු ලැබ සිරස් තලයක සමතුලිතව ඇත. $P = 250\text{ N}$ බව පෙන්වන්න.



බෝ අංකනය භාවිතයෙන් ප්‍රත්‍යාබල සටහනක් ඇඳ ඒ නගිස්, සියලු ම දඬුවල ප්‍රත්‍යාබල සොයා ඒවා ආතති ද තෙරපුම් ද යන්න ප්‍රකාශ කරන්න.

(a)



කුට්ටිය සඳහා \uparrow
 $R_1 + R_2 = W$ (10)

කුට්ටිය සඳහා \rightarrow
 $F = S$ (5)

$$AB \text{ සඳහා } \curvearrowleft_A \quad S \times a - 2W \times \frac{\sqrt{3}a}{2} = 0 \quad (10)$$

$$\therefore S = \sqrt{3}W \quad (5)$$


$$\mu \geq \frac{|F|}{(R_1 + R_2)} \quad (10)$$

$$\mu \geq \frac{\sqrt{3}W}{W}$$

$$\mu \geq \sqrt{3} \quad (5)$$

60

(b)




\curvearrowleft_C

$$150 \times 2a + 300 \left(2a - \frac{a}{2} \right) - P \cdot 3a = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow P = 250N \quad (5)$$

10



සන්ධි තුනට **30**


දණ්ඩ	ආතතිය	තෙරපුම
<i>AB</i>		$250\sqrt{3} N$ 10
<i>BC</i>		$200\sqrt{3} N$ 10
<i>CD</i>	$400 N$ 10	
<i>DA</i>	$500 N$ 10	
<i>DB</i>		$100\sqrt{3} N$ 10

80

16 වන ප්‍රශ්නය



16. කේන්ද්‍රය C හා අරය a වූ අර්ධ වෘත්තාකාර වාපයක හැඩයෙන් යුත් තුනී ඒකාකාර කම්බියක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය C සිට $\frac{2a}{\pi}$ දුරකින් ඇති බව පෙන්වන්න.

යාබද රූපයෙහි PQ, PR හා ST යනු, ඒකක දිගක ස්කන්ධය ρ වූ තුනී ඒකාකාර කම්බියකින් කපා ගත් සරල රේඛීය කැබලි තුනකි. PQ හා PR කැබලි දෙක P ලක්ෂ්‍යයෙහි දී එකිනෙකට පාස්සා ඉන් පසු Q හා R ලක්ෂ්‍යවල දී ST ට පාස්සා ඇත. $PQ = PR = a$, $ST = 2a$ හා $PO = \frac{a}{2}$ බව දී ඇත; මෙහි O යනු QR හා ST යන දෙකෙහි ම මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ. තව ද SUT යනු ඒකක දිගක ස්කන්ධය $k\rho$ වූ තුනී ඒකාකාර කම්බියකින් සාදා ගත් කේන්ද්‍රය O හා අරය a වූ අර්ධ වෘත්තාකාර වාපයකි; මෙහි $k (> 0)$ නියතයක් වේ. SUT අර්ධ වෘත්තාකාර කම්බිය PQR තලයේ S හා T ලක්ෂ්‍යවල දී ST කම්බියට පාස්සා රූපයේ දැක්වෙන L දෘඪ තල කම්බි රාමුව සාදා ඇත. L හි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය P සිට $\left(\frac{\pi k + 4k + 3}{\pi k + 4}\right) \frac{a}{2}$ දුරකින් ඇති බව පෙන්වන්න.



යාබද රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි L කම්බි රාමුව, එහි වෘත්තාකාර කොටස සුමට සිරස් බිත්තියක හා ලිස්සා යාම වැළැක්වීමට ප්‍රමාණවත් තරම් රළු තිරස් ගෙබිමක ස්පර්ශ වෙමින්, එහි තලය බිත්තියට ලම්බව සමතුලිතව ඇත. L මත ක්‍රියාකරන බල ලකුණු කර $k > \frac{1}{4}$ බව පෙන්වන්න.

දැන් $k = 1$ යැයි ගනිමු. P ලක්ෂ්‍යයේ දී ස්කන්ධය m වන අංශුවක් L ට සම්බන්ධ කළ පසු ද ඉහත පිහිටීමේ ම සමතුලිතතාව පවත්වාගෙන යයි. $m < 3\rho a$ බව පෙන්වන්න.



5

සමමිතියෙන්, ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G , CA මත පිහිටයි. සහ $OG = \bar{x}$

5

ρ යනු ඒකක දිගක ස්කන්ධය යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට } \Delta m = a(\Delta\theta)\rho \text{ සහ } \bar{x} = \frac{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \rho a \cos\theta d\theta}{\pi a \rho} = \frac{a}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta d\theta$$

$$= \frac{a}{\pi} \cdot \sin\theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{a}{\pi} \left[2 \sin \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= \frac{2a}{\pi}$$

එනසින් ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය C සිට $\frac{2a}{\pi}$ දුරකින් පවතී.

35

වස්තුව	ස්කන්ධය	සිරස් දුර, P සිට ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට කේන්ද්‍රයට
PR	$a\rho$	$\frac{a}{4}$ (5)
PQ	$a\rho$	$\frac{a}{4}$ (5)
ST	$2a\rho$	$\frac{a}{2}$ (5)
SUT	$\pi a k \rho$ (5)	$\frac{a}{2} + \frac{2a}{\pi}$ (5)
සංයුක්ත වස්තුව	$(4 + \pi k)a\rho$ (5)	\bar{x}_1

සමමිතියෙන් L හි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය P හා O යා කරන රේඛාව මත පිහිටයි. (5)

ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ අර්ථ දැක්වීම මගින්,

$$(4a\rho + \pi a k \rho) \bar{x}_1 = 2a\rho \times \frac{a}{4} + 2a\rho \times \frac{a}{2} + \pi a k \rho \times \left(\frac{a}{2} + \frac{2a}{\pi} \right) \quad (15)$$

$$\Rightarrow (4 + \pi k) \bar{x}_1 = \frac{a}{2} + a + \frac{\pi a k}{2} + 2ak \quad (5)$$

$$\Rightarrow \bar{x}_1 = \left(\frac{\pi k + 4k + 3}{\pi k + 4} \right) \frac{a}{2}. \quad (5)$$


70

L රාමුව සමතුලිතතාවයෙන් දෙන ලද පිහිටුමේ තිබීමට $\bar{x}_1 > \frac{a}{2}$ විය යුතුයි. (5)

$$\text{i.e. } \left(\frac{\pi k + 4k + 3}{\pi k + 4} \right) \frac{a}{2} > \frac{a}{2}. \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow \pi k + 4k + 3 > \pi k + 4.$$

$$\Leftrightarrow k > \frac{1}{4}. \quad (5)$$




25

$k = 1$ යැයි ගනිමු.

$$\text{එවිට, } \bar{x}_1 = \left(\frac{\pi + 7}{\pi + 4} \right) \frac{a}{2}.$$

\bar{x}_2 යනු P සිට අලුත් ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට ඇති දුර ලෙස ගන්න.



$$\text{එවිට } [(4a\rho + \pi a \rho) + m] \bar{x}_2 = (4a\rho + \pi a \rho) \bar{x}_1. \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow [(4a\rho + \pi a \rho) + m] \bar{x}_2 = (4a\rho + \pi a \rho) \left(\frac{\pi + 7}{\pi + 4} \right) \frac{a}{2}$$

$$\Leftrightarrow [(4a\rho + \pi a \rho) + m] \bar{x}_2 = a\rho(\pi + 7) \frac{a}{2}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x}_2 = \frac{a\rho(\pi + 7)}{[(4a\rho + \pi a \rho) + m]} \frac{a}{2} \quad (5)$$

ඉහත පිහිටුමේ සමතුලිතව පිහිටීම $\bar{x}_2 > \frac{a}{2}$ විය යුතු වේ. (5)

$$\text{i.e. } \frac{a\rho(\pi + 7)}{[(4a\rho + \pi a \rho) + m]} \frac{a}{2} > \frac{a}{2}$$

$$\Leftrightarrow a\rho(\pi + 7) > 4a\rho + \pi a \rho + m$$

$$\Leftrightarrow m < 3a\rho. \quad (5)$$

20

17 වන ප්‍රශ්නය

17.(a) A, B හා C යන මලු එක එකක, පාවිච්චි හැර අන් සෑම අයුරකින්ම සර්වසම, සුදු බෝල හා කළු බෝල පමණක් අඩංගු වේ. A මල්ලෙහි සුදු බෝල 4 ක් හා කළු බෝල 2 ක් ද B මල්ලෙහි සුදු බෝල 2 ක් හා කළු බෝල 4 ක් ද C මල්ලෙහි සුදු බෝල m හා කළු බෝල $(m + 1)$ ක් ද අඩංගු වේ. මල්ලක් සසම්භාවීව තෝරා ගෙන එකකට පසු ව අනෙක ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනයෙන් තොරව සසම්භාවීව බෝල දෙකක් එම මල්ලෙන් ඉවතට ගනු ලැබේ. ඉවතට ගත් පළමු බෝලය සුදු හා ඉවතට ගත් දෙවන බෝලය කළු වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{5}{18}$ වේ. m හි අගය සොයන්න.

තව ද ඉවතට ගත් පළමු බෝලය සුදු හා ඉවතට ගත් දෙවන බෝලය කළු බව දී ඇති විට, C මල්ල තෝරා ගෙන තිබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

(b) ශිෂ්‍යයන් 100 ක කණ්ඩායමක්, සංඛ්‍යාත ප්‍රශ්නයකට ඔවුන්ගේ පිළිතුරු සඳහා ලබා ගත් ලකුණුවල ව්‍යාප්තිය පහත වගුවෙහි දැක්වේ.

ලකුණු පරාසය	ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
0 - 2	15
2 - 4	25
4 - 6	40
6 - 8	15
8 - 10	5

මෙම ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යන්‍යය μ හා සම්මත අපගමනය σ නිමානය කරන්න.

$\kappa = \frac{3(\mu - M)}{\sigma}$ මගින් අර්ථ දැක්වෙන කුටිකතා සංගුණකය κ ද නිමානය කරන්න; මෙහි M යනු ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යස්ථය වේ.

X යනු පළමු බෝලය සුදු සහ දෙවන බෝලය කළු යැයි ගනිමු.

X මුළු සම්භාවිතා නියමයෙන්,

5

$$P(X) = P(X | A) P(A) + P(X | B) P(B) + P(X | C) P(C). \text{-----(1)}$$

$$P(X | A) = \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{15} \quad (10)$$

$$P(X | B) = \frac{2}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{15} \quad (10)$$

$$P(X | C) = \frac{m}{(2m+1)} \cdot \frac{m+1}{2m} = \frac{(m+1)}{2(2m+1)} \quad (10)$$

$$\text{තවද, } P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}. \quad (5)$$

$$P(X) = \frac{5}{18}, \text{ නිසා}$$

$$(1) \Rightarrow \frac{5}{18} = \frac{4}{15} \times \frac{1}{3} + \frac{4}{15} \times \frac{1}{3} + \frac{(m+1)}{2(2m+1)} \times \frac{1}{3} \quad (10)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6} - \frac{8}{15} = \frac{(m+1)}{2(2m+1)} \quad (5)$$

$$\Rightarrow 3(2m+1) = 5(m+1)$$

$$\Rightarrow m = 2 \quad (5)$$

60

$$m = 2 \Rightarrow P(X|C) = \frac{3}{10} \quad (5)$$

බේසස් ප්‍රමේයයෙන්,

$$P(C|X) = \frac{P(X|C)P(C)}{P(X)} \quad (5)$$

$$= \frac{\frac{3}{10} \times \frac{1}{3}}{\frac{5}{18}} \quad (5)$$

$$= \frac{9}{25} \quad (5)$$

20

(b)

ලකුණු පරාසය	f	මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය x	x^2	fx	fx^2
0 - 2	15	1	1	15	15
2 - 4	25	3	9	75	225
4 - 6	40	5	25	200	1000
6 - 8	15	7	49	105	735
8 - 10	5	9	81	45	405
	$\sum f = 100$			$\sum fx = 440$	$\sum fx^2 = 2380$

$$\mu = \frac{\sum f x}{\sum f} = \frac{440}{100} = 4.4 \quad (5)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f x^2}{\sum f} - \mu^2} \quad (5)$$

$$= \sqrt{\frac{2380}{100} - \left(\frac{44}{10}\right)^2} \quad (5)$$

$$= \sqrt{23.8 - 19.36} \quad (5)$$

$$= \sqrt{4.44}$$

$$\approx 2.11. \quad (5)$$

50

$$M = 4 + \frac{10}{40} \times 2 \quad (5)$$

$$= 4.5. \quad (5)$$

$$K = \frac{3(4.4 - 4.5)}{2.11} \quad (5)$$

$$= -\frac{0.3}{2.11}$$

$$\approx 0.14. \quad (5)$$

20